



中华人民共和国国家标准

GB/T 8321.10—2018

农药合理使用准则(十)

Guideline for safety application of pesticides(X)

2018-02-06 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 项目和技术指标 1

 3.1 杀虫剂/杀螨剂 1

 3.2 杀菌剂/杀线虫剂 24

 3.3 除草剂/植物生长调节剂 46

前 言

GB/T 8321《农药合理使用准则》由下列几个部分组成：

- GB/T 8321.1—2000 农药合理使用准则(一)；
- GB/T 8321.2—2000 农药合理使用准则(二)；
- GB/T 8321.3—2000 农药合理使用准则(三)；
- GB/T 8321.4—2004 农药合理使用准则(四)；
- GB/T 8321.5—2004 农药合理使用准则(五)；
- GB/T 8321.6—2000 农药合理使用准则(六)；
- GB/T 8321.7—2002 农药合理使用准则(七)；
- GB/T 8321.8—2007 农药合理使用准则(八)；
- GB/T 8321.9—2009 农药合理使用准则(九)；
- GB/T 8321.10—2018 农药合理使用准则(十)。

本部分为 GB/T 8321 的第 10 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。

本部分起草单位：农业部农药检定所。

本部分主要起草人：叶贵标、简秋、秦冬梅、龚勇、朱光艳、郑尊涛、顾宝根、季颖、叶纪明、单炜力、周力、武丽芬。

农药合理使用准则(十)

1 范围

GB/T 8321 的本部分规定了 430 种农药在 50 种作物上 580 项合理使用准则。
本部分适用于农作物病、虫、草害的防治和植物生长调节剂的使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

3 项目和技术指标

3.1 杀虫剂/杀螨剂

杀虫剂/杀螨剂见表 1,最大残留限量按 GB 2763 执行。

表 1 杀虫剂/杀螨剂

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
1	阿维菌素	abamectin	0.2%可湿性粉剂	柑橘	红蜘蛛	800~1 000 倍液 (2 mg/L~2.5 mg/L)	喷雾	2	14		0.02
			0.9%乳油		红蜘蛛	1 500~2 000 倍液 (4.5 mg/L~6 mg/L)	喷雾	2	14		0.02
			1%乳油	梨	梨木虱	2 000~3 200 倍液 (3.1 mg/L~5 mg/L)	喷雾	2	14		0.02
			1.8%乳油	甘蓝	小菜蛾	33 mL~50 mL	喷雾	2	7		0.05
				萝卜	小菜蛾	30 mL~50 mL	喷雾	2	7		0.01
				普通白菜	小菜蛾	30 mL~50 mL	喷雾	2	5		0.05
2	甲氨基阿维菌素	abamectin-aminomethyl	2%乳油	水稻	稻纵卷叶螟	20 mL~30 mL	喷雾	2	21		0.02(糙米)
			1.8%可湿性粉剂	小白菜	菜青虫	30 g~40 g	喷雾	2	5		0.05
			0.5%乳油	甘蓝	小菜蛾	25 mL~50 mL	喷雾	2	7		0.1
3	乙酰甲胺磷	acephate	30%乳油	水稻	二化螟	175 mL~225 mL	喷雾	2	45		1(糙米)

表 1 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名								
4	啉虫脒	acetamiprid	柑橘	蚜虫	2 500~5 000 倍液 (40 mg/kg~80 mg/kg)	喷雾	3	21		0.5
			棉花	棉蚜	6 g~10 g	喷雾	2	21		0.1(棉籽)
			苹果	蚜虫	2 500~3 000 倍液 (10 mg/kg~12 mg/kg)	喷雾	1	14		0.8
			小麦	蚜虫	60 mL~80 mL	喷雾	2	14		0.5
			柑橘	蚜虫	4 000~5 000 倍液 (10 mg/L~12.5 mg/L)	喷雾	2	14		0.5
5	涕灭威	aldicarb	苹果	蚜虫	1 500~2 000 倍液 (15 mg/kg~20 mg/kg)	喷雾	1	14		0.8
			甘蓝	蚜虫	20 mL~40 mL	喷雾	2	7		0.5
			甘薯	茎线虫	2 000 g~3 000 g	穴施	1	—	甘薯苗移植时穴施	0.1
6	顺式氯氰菊酯	alpha-cypermethrin	玉米	地下害虫	1.5 mL/kg~1.75 mL/kg 种子 (0.30 g/kg~0.35 g/kg 种子)	拌种	1	—		0.05
7	磷化铝	aluminum phosphide	谷物	储粮害虫	3.5 g/m ³ ~5 g/m ³	熏蒸	1	45		0.05
8	印楝素	azadirachtin	甘蓝	小菜蛾	300 mL~500 mL	喷雾	3	5		0.1

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
9	三唑锡	azocyclotin	10%乳油	柑橘	红蜘蛛	1 000~1 500 倍液 (67 mg/L~100 mg/L)	喷雾	2	30		2
10	高效氯氟菊酯	beta-cypermethrin	4.5%乳油	甘蓝	菜青虫	30 mL~50 mL	喷雾	2	7		5
			4.5%水乳剂		菜青虫	30 mL~50 mL	喷雾	2	7		5
			4.5%微乳剂	甘蓝	菜青虫	30 mL~40 mL	喷雾	2	7		5
				苹果	桃小食心虫	1 000~1 500 倍液 (30 mg/L~45 mg/L)	喷雾	2	14		2
			4.5%悬浮剂	甘蓝	菜青虫	30 mL~40 mL	喷雾	2	7		5
11	甲萘威	carbaryl	85%可湿性粉剂	棉花	地老虎	120 g~160 g	喷雾	3	14		1(棉籽)
12	克百威	carbofuran	10%悬浮种衣剂	玉米	地下害虫	200 g/kg~250 g/kg 种子	种子包衣	1	—		0.1
13	丁硫克百威	carbosulfan	35%种子处理干粉剂	水稻	蓟马	6 g/kg~12 g/kg 种子	拌种	1	—		0.5(糙米)
			5%颗粒剂	甘薯	根结线虫	3 600 g~5 400 g	穴施或沟施	1	—	甘薯定植期用药	1
14	杀螟丹	cartap	4%颗粒剂	水稻	稻纵卷叶螟	1 500 g~2 250 g	撒施	1	21	撒施	0.1(糙米)
15	氯虫苯甲酰胺	chlorantraniliprole	20%悬浮剂	水稻	二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟	5 mL~10 mL	喷雾	2	21		

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
16	虫螨腈	chlorfenapyr	24%悬浮剂	黄瓜	斜纹夜蛾	36 mL~60 mL	喷雾	2	3		0.5
				苹果	金纹细蛾	3 333~4 000 倍液 (50 mg/kg~60 mg/kg)	喷雾	2	14		
				茄子	蓟马	24 mL~36 mL	喷雾	1	7		
			30%悬浮剂	甘蓝	小菜蛾	11 mL~23 mL	喷雾	1	14		1
			10%颗粒剂	甘蔗	蔗龟	1200 g~1 500 g	拌细沙撒施	1	—	苗期用药	0.05
17	毒死蜱	chlorpyrifos	15%颗粒剂	花生	地老虎、金针虫、蝼蛄	1 000 g~1 500 g	拌细土撒施	1	—	下针前施药	0.2
			5%颗粒剂	花生	蛴螬	1 500 g~3 000 g	拌细土撒施	1	—	下针前施药	0.2
			25%微乳剂	柑橘	红蜘蛛、锈壁虱、矢尖介	520~1 040 倍液 (240 mg/L~480 mg/L)	喷雾	2	21		1
			30%水乳剂	水稻	稻纵卷叶螟	80 mL~120 mL	喷雾	2	28		0.5(稻谷)
			30%微乳剂	棉花	蚜虫	100 mL~150 mL	喷雾	2	28		0.3(棉籽)
			40%乳油	大豆	食心虫	80 mL~100 mL	喷雾	2	带荚青豆 21 d, 大豆 35 d		0.1
				荔枝	蒂蛀虫	800~1 000 倍液 (400 mg/L~500 mg/L)	喷雾	2	14		1
				萝卜	菜青虫、蚜虫	90 mL~120 mL	喷雾	2	14		1
			48%乳油	水稻	稻纵卷叶螟	100 mL~120 mL	喷雾	2	28		0.5(稻谷)
				玉米	地下害虫	150 mL~180 mL	灌根	1		苗期用药	0.05
				甘蓝	地下害虫	80 mL~100 mL	拌细土撒施	1	—	定植后 5 d 左右施药	1

表 1 (/)

序号	农药		防治对象	适用作物	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量							
18	四螨嗪	clofentezine	10%可湿性粉剂	柑橘	800~1 000 倍液 (100 mg/L~125 mg/L)	喷雾	2	14		0.5
19	氯氰菊酯	cyperme-thrin	5%微乳剂	萝卜	40 mL~60 mL	喷雾	2	7		
20	灭蝇胺	cyromazine	50%可湿性粉剂	菜豆	25 g~30 g	喷雾	2	7		0.5
21	溴氰菊酯	deltamethrin	2.5%乳油	甘蓝	20 mL~40 mL	喷雾	2	7		0.5
				萝卜	20 mL~40 mL	喷雾	2	7		0.2
				普通白菜	30 mL~50 mL	喷雾	2	7		0.5
22	丁醚脲	diafenthui- ron	25%乳油	甘蓝	80 mL~120 mL	喷雾	1	7		2
			50%可湿性粉剂	甘蓝	37.5 mL~45 mL	喷雾	2	7		2
			50%悬浮剂	茶叶	100 mL~120 mL	喷雾	2	7		5
23	二嗪磷	diazinon	4%颗粒剂	普通白菜	1 200 g~1 500 g	拌土撒施	1	30		0.2
24	敌敌畏	dichlorvos	22%烟剂	黄瓜(大棚)	273 g~400 g	点燃放烟	2	3		0.2
			28%缓释剂	玉米	28.6 g~40 g 制剂/吨粮	放置熏蒸	1	180		0.2
			80%乳油	普通白菜	50 mL~100 mL	喷雾	2	5		0.2
				甘蓝	50 mL~100 mL	喷雾	2	5		0.5

表 1 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名 剂型及含量								
25	除虫脲	diflubenzuron	甘蓝	菜青虫	30 mL~50 mL	喷雾	2	14		2
			茶叶	茶尺蠖	1 000~1 500 倍液 (33 mg/L~50 mg/L)	喷雾	1	5		20
26	乐果	dimethoate	甘蓝	蚜虫	75 mL~100 mL	喷雾	2	7		1
			萝卜	蚜虫	75 mL~100 mL	喷雾	2	7		0.5
			普通白菜	蚜虫	50 mL~100 mL	喷雾	2	10		1
27	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	emamectin benzoate	甘蓝	小菜蛾	50 mL~60 mL	喷雾	2	5		0.1
					20 mL~24 mL					
			甘蓝	小菜蛾、 菜青虫	10 mL~30 mL	喷雾	2	5		0.1
					6 mL~8 mL					
			甘蓝	小菜蛾	4 g~6 g	喷雾	2	5		0.1
			甘蓝	甜菜夜蛾	3 g~4 g	喷雾	2	21		0.1
28	乙螨唑	etoxazole	柑橘	红蜘蛛	5 000~7 500 倍液 (14.7 mg/L~22 mg/L)	喷雾	1	21		0.5
29	苯丁锡	fenbutatin oxide	柑橘	红蜘蛛	500~600 倍液 (167 mg/L~200 mg/L)	喷雾	2	21		1
30	甲氧菊酯	fenprothrin	普通白菜	小菜蛾、 菜青虫	40 mL~80 mL	喷雾	1	14		1
			萝卜	菜青虫	40 mL~80 mL	喷雾	2	7		0.5

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
31	唑螨酯	fenpyroximate	5%悬浮剂	棉花	叶螨	20 mL~40 mL	喷雾	2	15		0.1(棉籽)
32	氟铃脲	hexaflumuron	5%乳油	甘蓝	小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾	27 mL~60 mL	喷雾	2	7		0.5
				棉花	棉铃虫	120 mL~160 mL	喷雾	2	21		
33	吡虫啉	imidacloprid	10%可湿性粉剂	萝卜	蚜虫	10 g~20g	喷雾	2	7		0.5
				苹果	黄蚜	2 000~4 000 倍液 (25 mg/L~50 mg/L)	喷雾	2	14		0.5
				水稻	叶蝉、飞虱	10 g~20 g	喷雾	2	14		0.05(糙米)
			25%可湿性粉剂	小麦	蚜虫	30 g~40 g	喷雾	2	14		0.05
				水稻	稻飞虱	4 g~8 g	喷雾	2	14		0.05(糙米)
				小麦	蚜虫	北方地区:12 g~16 g; 南方地区:4 g~8 g	喷雾	2	14		0.05
			10%乳油	萝卜	蚜虫	20 mL~30 mL	喷雾	2	7		0.5
				水稻	飞虱	20 mL~40 mL	喷雾	2	14		0.05(糙米)
			5%乳油	甘蓝	蚜虫	20 mL~24 mL	喷雾	2	7		1
				水稻	飞虱	40 mL	喷雾	3	14		0.05(糙米)
			20%可溶性液剂	烟草	蚜虫	30 mL~50 mL	喷雾	2	21		
				苹果	黄蚜	2 500~5 000 倍液 (40 mg/L~80 mg/L)	喷雾	2	14		0.5

表 1 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名								
33	吡虫啉	imidacloprid	甘蓝	蚜虫	6 mL~8 mL	喷雾	3	7		1
			甘蓝	蚜虫	3 mL~5 mL	喷雾	3	7		1
			水稻	稻飞虱	4 mL~5 mL	喷雾	2	14		0.05(糙米)
			水稻	稻飞虱	5 mL~7 mL	喷雾	2	14		0.05(糙米)
			茶叶	小绿叶蝉	2 g~4 g	喷雾	1	7		0.5
			甘蓝	蚜虫	2.86 g	喷雾	3	7		1
			棉花	蚜虫	2 g~4 g	喷雾	1	14		0.05(棉籽)
34	氯噻啉	imidaclothiz	苹果	苹果黄蚜	14 000~25 000 倍液 (28 mg/L~50 mg/L)	喷雾	1	14		0.5
			水稻	稻飞虱	2.5 g~3.5 g	喷雾	2	14		0.05(糙米)
			茶叶	小绿叶蝉	20 g~30 g	喷雾	1	5		
			番茄(大棚)	白粉虱	15 g~30 g	喷雾	2	7		
			甘蓝	蚜虫	10 g~15 g	喷雾	3	7		
			柑橘	蚜虫	4 000~5 000 倍液 (20 mg/L~25 mg/L)	喷雾	3	14		
			小麦	蚜虫	1 g~20 g	喷雾	2	14		
35	茚虫威	indoxacarb	水稻	稻飞虱	4 g~5 g	喷雾	3	21		
			甘蓝	小菜蛾	10 mL~18 mL	喷雾	3	7		3
			棉花	棉铃虫	10 mL~18 mL	喷雾	3	14		0.1(棉籽)

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
36	水胺硫磷	isocarbo-phos	40%乳油	棉花	红蜘蛛、棉铃虫	50 mL~100 mL	喷雾	2	28		0.05(棉籽)
				水稻	蓟马、螟虫	75 mL~200 mL	喷雾	3	21		0.1(糙米)
				甘蔗	蔗龟	5 000 g	沟施或穴施	1	—		0.02
37	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	2.5%颗粒剂	小麦	吸浆虫	1 320 g~2 000 g	撒施或拌毒土撒施	1	21		0.02
38	异丙威	isoprocarb	20%烟剂	黄瓜(大棚)	白粉虱	200 g~300 g	薰蒸	2	5		0.5
39	高效氯氟氰菊酯	lambda-cyhalothrin	10%可湿性粉剂	甘蓝	菜青虫	8 g~12 g	喷雾	3	7		1
			10%种子处理微囊悬浮剂	玉米	蛴螬	2 mL/kg~3 mL/kg 种子	种子包衣	1	—		0.02
			5%微乳剂	普通白菜	菜青虫	15 mL~27 mL	喷雾	3	7		2
40	马拉硫磷	malathion	1.8%粉剂	仓储原粮	储粮害虫	666.7 g/1 000 kg 原粮~1 333.3 g/1 000 kg 原粮	拌粮	1	365	原粮晒后降温晾凉储存时拌粮	8
			45%乳油	柑橘	蚜虫	1 500~2 000 倍液 (225 mg/L~300 mg/L)	喷雾	3	21		2
41	苦参碱	matrine	0.36%乳油	梨	黑星病	400~600 倍液 (6 mg/L~9 mg/L)	喷雾	3	21		

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
42	四聚乙醛	metalddehyde	6%颗粒剂	烟草	蛴螬、蜗牛	400 g~545 g	撒施	2	42		
43	威百亩	metamsodium	35%水剂	黄瓜	根结线虫	4 000 mL~6 000 mL	沟施	1	—	土壤处理	0.05
44	甲氧虫酰肼	methoxyfenozide	24%悬浮剂	甘蓝	甜菜夜蛾	10 mL~20 mL	喷雾	3	7	生长期施药	2
				苹果	小卷叶蛾	3 000~5 000 倍液 (48 mg/L~80 mg/L)	喷雾	1	50		3
				水稻	二化螟	20 mL~28 mL	喷雾	1	45		
45	烯啶虫胺	nitentpyram	10%可溶液剂	柑橘	蚜虫	4 000~5 000 倍液 (20 mg/kg~25 mg/kg)	喷雾	3	14		0.5
46	氧乐果	omethoate	18%乳油	棉花	蚜虫	47 g~75 g	喷雾	2	14		0.02(棉籽)
			40%乳油	小麦	蚜虫	50 mL~75 mL	喷雾	2	14		0.02
47	甲拌磷	phorate	3%颗粒剂	棉花	蚜虫	3 000 g~4 000 g	沟施	1	—	苗期沟施	0.05(棉籽)
			30%粉粒剂	小麦	地下害虫	10 g/kg~20 g/kg 种子	拌种	1	—		0.02
			55%乳油	棉花	蚜虫	6 g/kg~8 g/kg 种子	拌种	1	—		0.05(棉籽)
48	辛硫磷	phoxim	3%颗粒剂	花生	地下害虫	6 667 g~8 333 g	穴施	1	—	播种时撒施	0.05
				玉米	玉米螟	250 g~350 g	撒施	1	—	喇叭口期施药	0.05
			40%乳油	甘蓝	菜青虫	75 mL~100 mL	喷雾	3	7		0.1
				萝卜	菜青虫	75 mL~100 mL	喷雾	3	7		0.05
				普通白菜	菜青虫	60 mL~90 mL	喷雾	2	7		0.1

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施 用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药 方法	每季作物最 多使用次数	最后一次施药 距收获的天数 (安全间隔 期)/d	实施要点 说明	最大残留 限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
49	甲基噻啉磷	pirimiphos-methyl	50%乳油	仓储稻谷	赤拟谷盗、谷蠹、玉米象	10 mg/kg~15 mg/kg 稻谷	喷雾	1	90		5(稻谷)
50	炔螨特	propargite	20%水乳剂	苹果	二斑叶螨	1 000~1 500 倍液 (133.3 mg/L~200 mg/L)	喷雾	3	14		5
			40%乳油	柑橘	红蜘蛛	700~1 400 倍液 (285 mg/L~570 mg/L)	喷雾	3	21		5
51	丙溴磷	protenofos	40%乳油	水稻	稻纵卷叶螟	90 mL~110 mL	喷雾	3	21		0.02(糙米)
			50%乳油	棉花	棉铃虫	100 mL~125 mL	喷雾	2	21		0.05(棉籽油)
52	吡蚜酮	pymetrozine	25%可湿性 粉剂	水稻	稻飞虱	16 g~20 g	喷雾	2	14		
				小麦	灰飞虱、蚜虫	16 g~20 g	喷雾	2	14		0.02
			50%水分散性 粒剂	水稻	稻飞虱	12 g~20 g	喷雾	1	14		
53	除虫菊素	pyrethrins	5%乳油	白菜	蚜虫	30 mL~50 mL	喷雾	3	3		
54	哒螨灵	pyridaben	15%乳油	柑橘	红蜘蛛	2 500~3 000 倍液 (50 mg/L~60 mg/L)	喷雾	2	14		2
				苹果	红蜘蛛	2 240~3 000 倍液 (50 mg/L~67 mg/L)	喷雾	2	14		2
			20%可湿性 粉剂	苹果	红蜘蛛	3 000~4 000 倍液 (50 mg/L~66.7 mg/L)	喷雾	2	14		2

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
55	三氟甲吡醚	pyridalyl	10%乳油	甘蓝	小菜蛾	50 mL~70 mL	喷雾	1	7		
56	鱼藤酮	rotenone	2.5%乳油	甘蓝	蚜虫	100 mL~150 mL	喷雾	3	7		0.5
57	乙基多杀菌素	spinetoram	6%悬浮剂	茄子	蓟马	10 mL~20 mL	喷雾	3	7		0.1
				甘蓝	甜菜夜蛾、小菜蛾	20 mL~40 mL	喷雾	3	7		0.5
58	螺虫乙酯	spirotetramat	24%悬浮剂	柑橘	介壳虫	4 000~5 000 倍液 (48 mg/L~60 mg/L)	喷雾	1	45		1
59	硫酰氟	sulfuryl	99%气体制剂	小麦	仓储害虫	10 g/m ³	密闭熏蒸	1	3		
60	虫酰肼	tebufenozide	20%可湿性粉剂	甘蓝	甜菜夜蛾	50 g~100 g	喷雾	2	21		1
61	三氯杀螨砜	tetradifon	10%乳油	苹果	红蜘蛛	500~800 倍液 (125 mg/L~200 mg/L)	喷雾	1	14		2
62	噻虫啉	thiacloprid	48%悬浮剂	黄瓜	蚜虫	7 mL~14 mL	喷雾	3	3		1
63	噻虫嗪	thiamethoxam	25%水分散粒剂	水稻	稻飞虱	2 g~4 g	喷雾	2	28		0.1(糙米)
				西瓜	蚜虫	8 g~10 g	喷雾	2	7		0.2
64	唑虫酰胺	tolfenpyrad	15%乳油	白菜	小菜蛾	30 mL~50 mL	喷雾	2	14		0.5(大白菜)
				甘蓝	小菜蛾	30 mL~50 mL	喷雾	2	14		0.5
				茄子	蓟马	50 mL~80 mL	喷雾	3	3		0.5
				水稻	三化螟	120 mL~150 mL	喷雾	3	42		0.05(稻谷)

表 1 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名								
66	敌百虫	trichlorfon	甘蓝	菜青虫	150 mL~200 mL	喷雾	1	7		0.1
			萝卜	菜青虫	150 mL~200 mL	喷雾	1	7		0.5
67	藜芦碱	veratrine	甘蓝	菜青虫	75 mL~100 mL	喷雾	3	7		
			棉花	棉铃虫	75 mL~100 mL	喷雾	3	7		
68	硝虫硫磷	xiaochongli- iulin	柑橘	矢尖蚧	600~750 倍液 (500 mg/L~400 mg/L)	喷雾	2	28		
69	阿维菌素 + 啉虫脲	abamectin + acetamiprid	黄瓜	蚜虫等虫害	10 mL~20 mL	喷雾	3	3		阿 维 菌 素： 0.02； 啉 虫 脲：1
70	阿维菌素 + 抑食肼	abamectin + benzoic acid	甘 蓝	菜青虫	40 g~50 g	喷雾	1	7		阿 维 菌 素： 0.05
71	阿维菌素 + 高效氯 氰菊酯	abamectin + beta- cypermethrin	甘 蓝	菜青虫、 小菜蛾	27.78 mL~55.56 mL	喷雾	2	7		阿维菌素： 0.05；高效 氯氰菊酯：5
			甘 蓝	菜青虫、 小菜蛾	30 mL~60 mL	喷雾	2	7		阿维菌素： 0.05；高效氯 氰菊酯：5
			黄瓜	美洲斑潜蝇	20 mL~40 mL	喷雾	2	3		阿维菌素： 0.02； 高效氯氰 菊酯：0.2

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
72	阿维菌素+联苯菊酯	abamectin+bifenthrin	3.3%乳油(联苯菊酯 30 g/L+阿维菌素 3 g/L)	甘蓝	小菜蛾	50 mL~80 mL	喷雾	1	7		阿维菌素: 0.05; 联苯菊酯: 0.2
73	阿维菌素+丁醚脲	abamectin+diafenthiuron	15.6%乳油(阿维菌素 0.6%+丁醚脲 15%)	苹果	红蜘蛛	2 000~3 000 倍液 (52 mg/L~78 mg/L)	喷雾	2	14		阿维菌素: 0.02; 丁醚脲:0.5
74	阿维菌素+甲氰菊酯	abamectin+fenpropathrin	5.1%可湿性粉剂(阿维菌素 0.1%+甲氰菊酯 5%)	甘蓝	小菜蛾	40 g~60 g	喷雾	3	14		阿维菌素: 0.05; 甲氰菊酯: 0.5
75	阿维菌素+吡虫啉	abamectin+imidacloprid	1.7%微乳剂(阿维菌素 0.2%+吡虫啉 1.5%)	烟草	蚜虫	40 mL~50 mL	喷雾	3	7		
76	阿维菌素+杀虫单	abamectin+monosultap	20%微乳剂(阿维菌素 0.2%+杀虫单 19.8%)	菜豆	美洲斑潜蝇	30 mL~60 mL	喷雾	1	7		阿维菌素: 0.1; 杀虫单:2
77	阿维菌素+辛硫磷	abamectin+phoxim	15%乳油(阿维菌素 0.3%+辛硫磷 14.7%)	甘蓝	小菜蛾	50 mL~75 mL	喷雾	3	7		阿维菌素: 0.05; 辛硫磷:0.1

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
78	阿维菌素+ 炔螨特	abamectin+ propargite	56%微浮剂(阿维菌素 0.3%+炔螨特 55.7%)	柑橘	红蜘蛛	2 000~4 000 倍液 (140 mg/L~280 mg/L)	喷雾	2	14		阿维菌素: 0.02; 炔螨特:5
79	阿维菌素+ 哒螨灵	abamectin+ pyridaben	10%乳油(阿维菌素 0.2%+哒螨灵 9.8%)	苹果	红蜘蛛	2 000~4 000 倍液 (25 mg/L~50 mg/L)	喷雾	2	14		阿维菌素: 0.02; 哒螨灵:2
80	阿维菌素+ 三唑磷	abamectin+ triazophos	20%乳油(阿维菌素 0.2%+三唑磷含量 19.8%)	水稻	二化螟	60 mL~80 mL	喷雾	2	28	水稻拔节后施药	阿维菌素 0.02(糙米); 三唑磷:0.05 (稻谷)
81	啶虫脒+ 毒死蜱	acetamiprid+ chlorpyrifos	30%水乳剂(啶虫脒 1%+毒死蜱 29%)	柑橘	柑橘蚜虫	1 000~1 500 倍液 (200 mg/L~300 mg/L)	喷雾	3	14		啶虫脒:0.5; 毒死蜱:1
82	高效氯氰菊酯+ 噻嗪酮	beta- cypermethrin+ buprofezin	20%乳油(高效氯氰菊酯 2%+噻嗪酮 18%)	番茄(大棚)	白粉虱	65 mL~80 mL	喷雾	2	2		高效氯氰菊酯:0.2; 噻嗪酮:2
83	高效氯氰菊酯+ 毒死蜱	beta- cypermethrin+ chlorpyrifos	20%乳油(毒死蜱 18%+高效氯氰菊酯 2%)	甘蓝	甜菜夜蛾	60 mL~100 mL	喷雾	3	7		高效氯氰菊酯:1; 毒死蜱:1
				棉花	棉铃虫	40 mL~60 mL	喷雾	3	21		高效氯氰菊酯 0.05 (棉籽); 毒死蜱 0.3

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
84	高效氯氰菊酯+甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	beta-cypermethrin+emamectin benzoate	2%微乳剂(高效氯氰菊酯1.9%+甲氨基阿维菌素0.1%)	甘蓝	小菜蛾、斜纹夜蛾	40 mL~60 mL	喷雾	3	7		高效氯氰菊酯:1;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐:0.1
			3%微乳剂(高效氯氰菊酯2.7%+甲氨基阿维菌素0.3%)								
			4%微乳剂(高效氯氰菊酯3.7%+甲氨基阿维菌素0.3%)								
			4.2%乳油(高效氯氰菊酯4%+甲氨基阿维菌素0.2%)		甜菜夜蛾	60 mL~70 mL	喷雾	1	7		高效氯氰菊酯:1;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐:0.1
85	高效氯氰菊酯+辛硫磷	beta-cypermethrin+phoxim	22%乳油(高效氯氰菊酯1%+辛硫磷21%)	荔枝	卷叶虫	1 500~2 000 倍液(110 mg/L~147 mg/L)	喷雾	2	7		高效氯氰菊酯:0.1;辛硫磷:0.05

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
86	联苯菊酯+吡虫啉	bifenthrin+imidacloprid	15%悬浮剂 (吡虫啉 10%+联苯菊酯 5%)	茶叶	茶小绿叶蝉	30 mL~45 mL	喷雾	1	7		联苯菊酯:5; 吡虫啉:0.5
87	噻嗪酮+杀扑磷	buprofezin+methidathion	20%可湿性粉剂 (噻嗪酮 15%+杀扑磷 5%)	柑橘	矢尖蚧	800~1 000 倍液 (200 mg/L~250 mg/L)	喷雾	2	21		噻嗪酮:0.5; 杀扑磷:2
88	甲萘威+四聚乙醛	carbaryl+metaldehyde	6%颗粒剂 (1.5%甲萘威+4.5%四聚乙醛)	普通白菜	蜗牛	600 g~750 g	撒施	2	7		甲萘威:1;四 聚乙醛:3
89	克百威+茛锈灵+福美双	carbofuran+carboxin+thiram	25%悬浮种衣剂(福美双 11.5%+克百威 7%+茛锈灵 6.5%)	玉米	金针虫、蛴蛄、蛴蛄、丝黑穗病、小地老虎	1:40~1:50(药种比)	拌种	1	—		克百威:0.1; 茛锈灵:0.2; 福美双:0.1
90	克百威+马拉硫磷	carbofuran+malathion	3%颗粒剂 (克百威 1%+马拉硫磷 2%)	水稻	飞虱	2 000 g~2 500 g	撒施	1	—	播种后或移栽前	克百威:0.1 (糙米);马拉 硫磷:1(糙 米)
91	克百威+甲拌磷	carbofuran+phorate	25%悬浮种衣剂(克百威 8%+甲拌磷 17)	花生	地老虎、金 针虫、蛴蛄、 蛴蛄	药种比:1% (10 g/kg 种子)	种子包衣	1	—	拌种	克百威:0.2; 甲拌磷:0.1

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
92	克百威+福美双	carbofuran+thiram	30%种子处理剂(克百威10%+福美双20%)	大豆	地下害虫、根腐病	267 g/100 kg~400 g/100 kg 种子(80 g/100 kg~120 g/100 kg 种子)	种子包衣	1	—		克百威:0.2; 福美双:0.3
93	丁硫克百威+毒死蜱	carbosulfan+chlorpyrifos	5%颗粒剂(丁硫克百威1%+毒死蜱4%)	花生	根结线虫	3 000 g~5 000 g	沟施	1	—		丁硫克百威:0.05; 毒死蜱:0.2
94	丁硫克百威+戊唑醇+福美双	carbosulfan+tebuconazole+thiram	20%悬浮种衣剂(丁硫克百威6%+戊唑醇0.4%+福美双13.6%)	玉米	地下害虫、丝黑穗病	16.7 g~25 g/kg 种子	拌种	1	—		丁硫克百威:0.1; 福美双:0.1
95	毒死蜱+氟啶脲	chlorpyrifos+chlorfluazuron	10%水乳剂(毒死蜱9%+氟啶脲1%)	甘蓝	菜青虫 小菜蛾	80 mL~100 mL	喷雾	1	14		毒死蜱:1; 氟啶脲:2
96	毒死蜱+灭蝇胺	chlorpyrifos+cyromazine	25%可湿性粉剂(毒死蜱20%+灭蝇胺5%)	黄瓜	黄瓜美洲斑潜蝇	30 g~50 g	喷雾	2	3		毒死蜱:0.1; 灭蝇胺:1
97	毒死蜱+辛硫磷	chlorpyrifos+phoxim	5%颗粒剂(毒死蜱2%+辛硫磷3%)	甘蔗	蔗螟	3 kg~4 kg	撒施或沟施	1	—		毒死蜱:0.05; 辛硫磷:0.05

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
98	毒死蜱+丙溴磷	chlorpyrifos+protenofos	30%乳油(毒死蜱 12%+丙溴磷 18%)	甘蓝	美洲斑潜蝇、小菜蛾、斜纹夜蛾	80 mL~100 mL	喷雾	1	14		毒死蜱:1;丙溴磷:0.5
99	四螨嗪+哒螨灵	clofentazine+pyridaben	10%悬浮剂(四螨嗪 3.5%+哒螨灵 6.5%)	苹果	红蜘蛛	1 000~2 000 倍液 (35 mg/kg~70 mg/kg)	喷雾	1	14		四螨嗪:0.5;哒螨灵:2
100	氯氰菊酯+马拉硫磷	cypermeth-rin+malathion	16%乳油(氯氰菊酯 2%+马拉硫磷 14%)	荔枝	荔枝蜡蛾	1 500~2 000 倍液 (80 mg/L~106.7 mg/L)	喷雾	3	7		氯氰菊酯:0.5;马拉硫磷:0.5
101	氯氰菊酯+丙溴磷	cypermeth-rin+protenofos	44%乳油(氯氰菊酯 4%+丙溴磷 40%)	柑橘	潜叶蛾	2 000~3 000 倍液 (146.7 mg/L~220 mg/L)	喷雾	3	14		氯氰菊酯:1;丙溴磷:0.2
102	敌敌畏+毒死蜱	dichlorvos+chlorpyrifos	35%乳油(敌敌畏 25%+毒死蜱 10%)	水稻	稻纵卷叶螟	80 mL~100 mL	喷雾	2	14		敌敌畏:0.2(糙米);毒死蜱:0.5(稻谷)
103	敌敌畏+仲丁威	dichlorvos+fenobucarb	20%乳油(敌敌畏 12%+仲丁威 8%)	水稻	飞虱	100 mL~120 mL	喷雾	3	14		敌敌畏:0.2(糙米);仲丁威:0.5(稻谷)
104	敌敌畏+氰戊菊酯	dichlorvos+fenvaleate	20%乳油(敌敌畏 15%+氰戊菊酯 5%)	桃树	蚜虫	2 000~3 000 倍液 (66.67 mg/kg~100 mg/kg)	喷雾	2	14		敌敌畏:0.1;氰戊菊酯:0.2

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
105	乐果+氰戊菊酯	dimethoate+fenvalerate	25%乳油(乐果 22.8%+氰戊菊酯 2.2%)	小麦	蚜虫	48 mL~60 mL	喷雾	3	21		乐果: 0.05; 氰戊菊酯:2
106	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐+毒死蜱	emamectin benzoate+chlorpyrifos	40%水乳剂(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.4%+毒死蜱 39.6%)	水稻	二化螟	20 mL~30 mL	喷雾	3	21		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐:0.02(糙米);毒死蜱:0.5(稻谷)
107	杀螟硫磷+辛硫磷	fenitrothion+phoxim	46%乳油(杀螟硫磷 30%+辛硫磷 16%)	棉花	棉铃虫	40 mL~50 mL	喷雾	1	30		杀螟硫磷:0.1(棉籽)
108	仲丁威+稻丰散	fenobucarb+phenthoate	40%乳油(稻丰散 18%+仲丁威 22%)	节瓜	蓟马	75 mL~150 mL	喷雾	3	7		仲丁威:0.05;稻丰散:0.1
109	甲氰菊酯+马拉硫磷	fenpropathrin+malathion	40%乳油(甲氰菊酯 5%+马拉硫磷 35%)	苹果	桃小食心虫	1 000~2 000 倍液 (200 mg/L~400 mg/L)	喷雾	3	14		甲氰菊酯:5; 马拉硫磷:2
110	甲氰菊酯+氧乐果	fenpropathrin+omethoate	20%乳油(甲氰菊酯 15%+氧乐果 5%)	小麦	麦蚜	50 mL~75 mL	喷雾	1	14		甲氰菊酯:0.1;氧乐果:0.02
			30%乳油(甲氰菊酯 8%+氧乐果 22%)	大豆	食心虫	60 mL~80 mL	喷雾	2	14		甲氰菊酯:0.1;氧乐果:0.05

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
111	唑戊菊酯+炔螨特	fenpyroximate + propargite	13%水乳剂(唑戊菊酯 3%+炔螨特 10%)	柑橘	红蜘蛛	1 000~1 500 倍液 (86.7 mg/L~130 mg/L)	喷雾	2	14		唑戊菊酯:0.2; 炔螨特:5
112	氰戊菊酯+杀螟硫磷	fenvalerate + fenitrothion	20%乳油(杀螟硫磷 14%+氰戊菊酯 6%)	甘蓝	菜青虫、蚜虫	30 mL~60 mL	喷雾	2	14		氰戊菊酯: 0.5; 杀螟硫磷:0.2
113	氰戊菊酯+马拉硫磷	fenvalerate + malathion	21%乳油(氰戊菊酯 6%+马拉硫磷 15%)	花生	斜纹夜蛾	20 mL~40 mL	喷雾	3	21		氰戊菊酯: 0.1
114	氰戊菊酯+氧乐果	fenvalerate + omethoate	30%乳油(氰戊菊酯 3%+氧乐果 27%)	大豆	蚜虫	30 mL~40 mL	喷雾	2	21		氰戊菊酯: 0.1; 氧乐果: 0.05
115	氟铃脲+辛硫磷	hexaflumuron + phoxim	15%乳油(氟铃脲 2%+辛硫磷 13%)	棉花	棉铃虫	80 mL~100 mL	喷雾	1	21		
116	吡虫啉+异丙威	imidacloprid + isoprocarb	35%可湿性粉剂(吡虫啉 3%+异丙威 32%)	水稻	稻飞虱	20 g~25 g	喷雾	2	14		吡虫啉:0.05 (糙米); 异丙威:0.2(大米)
117	吡虫啉+杀虫单	imidacloprid + monosultap	70%可湿性粉剂(吡虫啉 2%+杀虫单 68%)	水稻	稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟	42 g~72 g	喷雾	1	21		吡虫啉:0.05 (糙米); 杀虫单:0.5(糙米)

表 1 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
118	甲基异柳磷+福美双	isofenphos-methyl+thiram	15%悬浮种衣剂(甲基异柳磷 5%+福美双 10%)	玉米	地下害虫、茎基腐病	1:40~1:50(药种比)	拌种	1	—		甲基异柳磷:0.02;福美双:0.1
119	马拉硫磷+辛硫磷	malathion+phoxim	25%乳油(马拉硫磷 12.5%+辛硫磷 12.5%)	大蒜	根蛆	750 mL~1 000 mL	灌根	1	21		马拉硫磷:0.5;辛硫磷:0.1
120	马拉硫磷+敌百虫	malathion+trichlorfon	60%乳油(敌百虫 40%+马拉硫磷 20%)	棉花	蚜虫	50 mL~75 mL	喷雾	2	21		敌百虫:0.1(棉籽)
121	苦参碱+烟碱	matrine+nicotine	0.5%水剂(烟碱 0.45%+苦参碱 0.05%)	柑橘	矢尖蚧	500~1 000 倍液 (5 mg/L~10 mg/L)	喷雾	3	14		烟碱:0.2
			1.2%乳油(烟碱 0.7%+苦参碱 0.5%)	甘蓝	菜青虫	40 mL~50 mL	喷雾	3	7		烟碱:0.2
122	甲拌磷+辛硫磷	phorate+phoxim	10%粉粒剂(甲拌磷 4%+辛硫磷 6%)	大豆	地下害虫	600 g~750 g	撒毒土	1	—	播种后拌毒土撒施	甲拌磷:0.05;辛硫磷:0.05
123	辛硫磷+吡蚜灵	phoxim+pyridaben	29%乳油(辛硫磷 25%+吡蚜灵 4%)	柑橘	红蜘蛛	1 500~2 000 倍液 (145 mg/kg~193 mg/kg)	喷雾	2	14		辛硫磷:0.05;吡蚜灵:2
124	三唑磷+敌百虫	triazophos+trichlorfon	36%乳油(三唑磷 6%+敌百虫 30%)	水稻	二化螟	150 mL~180 mL	喷雾	2	28		三唑磷:0.05(稻谷);敌百虫:0.1(糙米)

3.2 续序号/续农药号

杀菌剂/杀线虫剂见表2,最大残留限量按GB 2763执行。

通 2 续序号/续农药号

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
1	代森铵	amobam	45% 水剂	苹果	腐烂病、枝干轮纹病	100~200 倍液 (2 250 mg /L~4 500 mg /L)	枝干涂抹	1	—		5
2	啉菌酯	azoxystrobin	25% 悬浮剂	黄瓜	霜霉病	32 mL~48 mL	喷雾	3	3		0.5
				荔枝	霜疫霉病	1 250~1 667 倍液 (150 mg/L~200 mg/L)	喷雾	3	14		0.5
				芒果	炭疽病	1 250~1 667 倍液 (150 mg/L~200 mg/L)	喷雾	3	14		1
				葡萄	霜霉病	1 000~2 000 倍液 (125 mg/L~250 mg/L)	喷雾	3	14		5
				西瓜	炭疽病	833~1 667 倍液 (150 mg/L~300 mg/L)	喷雾	3	14		1
				香蕉	炭疽病	1 000~1 500 倍液 (166.7 mg/L~250 mg/L)	喷雾	3	42		2
				柑橘	疮痂病、炭疽病	833 倍液 (300 mg/L)	喷雾	3	14		1

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 乐果氰/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
3	戊菊酯	benomyl	50%乳油小麦剂	蚜虫	喷雾甲	500~1 000 倍氨 (500 mg/L~1 000 mg/L)	基阿	2	14		5
				维	菌素甲	500~1 000 倍氨 (500 mg/L~667 mg/L)	基阿	3	14		3
				苯酸	盐毒甲	600~800 倍氨 (625 mg/L~833 mg/L)	基阿	3	21		
4	死蜱水	benzothiazolinone	1.5%稻二剂	化螟	糙蟀甲	116 mL~175 mL	基阿	3	3		0.1
5	米谷菊杀	boscalid	50%稻分硫磷剂	辛棉 (花铃/花籽)	仲蟀甲	30 g~45 g	基阿	3	3		3
6	丁菊威	bromothalonil	25%乳油小麦剂	丰散	节瓜甲	500~600 倍氨 (416.7 mg/L~500 mg/L)	基阿	3	14		0.2
7	丁蓟马	bronopol	20%乳油小麦剂	稻拉	苹桃甲	240 倍氨 (833 mg/L)	食心	1	:		
8	液菊氧	captan	50%乳油小麦剂	化螟	节瓜甲	125 g~187.5 g	基阿	3	3		5
				丰散	豆纹甲	400~800 倍氨 (625 mg/L~1 250 mg/L)	基阿	3	14		15
				葡萄	糙蟀甲	400~600 倍氨 (833 mg/L~1 250 mg/L)	基阿	3	7		5
			80%稻分硫磷剂	蚜虫	树脂甲	600~800 倍氨 (1 000 mg/L~1 333 mg/L)	基阿	3	14		5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)唑磷酯/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
9	多快特	carbendazim	50%水乳克柑剂	橘红	蜘蛛液	100 g	喷雾	1	35		0.05
				氰戊	快菊液	80 g~120 g	喷雾	2	38		0.1(氰戊杀)
10	螟硫磷 油甘蓝	chloroisobromine cyanuric acid	50%水菜克柑剂	青虫	蚜马液	60 g~80 g	喷雾	3	21		
11	螟拉花	chloropicrin	99%生药	纹夜	蛾氧液	13.3 L/667 m ² ~20 L/667 m ² (2 mL/乐果点~3 mL/乐果点)	乐果豆 氟铃脲	1	:	乐果点间 距辛 30 cm	
				虫棉	蛾吡氧液	13.3 L/667 m ² ~20 L/667 m ² (2 mL/乐果点~3 mL/乐果点)	乐果豆 氟铃脲	1	:	乐果点间 距辛 30 cm	
			99.5%斜剂	啉异	异丙液	13.3 L/667 m ² ~20 L/667 m ² (2 mL/乐果点~3 mL/乐果点)	乐果豆 氟铃脲	1	:	乐果点间 距辛 30 cm	
				威可	吡:蛾氧液	13.3 L/667 m ² ~20 L/667 m ² (2 mL/乐果点~3 mL/乐果点)	乐果豆 氟铃脲	1	:	乐果点间 距辛 30 cm	
12	湿快性	chlorothalonil	75%水乳克柑剂	粉可	稻蛛液	146.7 g~266.7 g	喷雾	3	14		5
13	飞虱快糙	coumoxystrobin	20%米单剂	纵卷	叶二液	133.3~200 倍斜 (1 000 mg/L~1 500 mg/L)	化三涂抹	1	:	早春纵卷 开花前	

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 克百威/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
14	福美双	cyazofamid	10%种子剂	处理	美豆地	53.3 mL~66.67 mL	下害	3	3		
				虫根	美豆地	2 000~2 500 倍腐 (40 mg/L~50 mg/L)	下害	3	7		
				病包衣	丁硫地	2 000~2 500 倍腐 (40 mg/L~50 mg/L)	下害	3	7		
				毒死	美豆地	2 000~2 500 倍腐 (40 mg/L~50 mg/L)	下害	3	7		
15	蝉颗粒 花双	difenoconazole	10%生分结线剂	醇理	悬浮地	50 g~75 g	下害	3	7		0.1
				玉米	悬浮地	1 000~1 500 倍腐 (66.7 mg/L~100 mg/L)	下害	2	7		10
			20%沟戊剂	虫根	悬浮地	444~667 倍腐 (150 mg/L~225 mg/L)	下害	3	7		0.5
				醇理	悬浮地	40 mL~60 mL	下害	3	7		0.1
16	啉腈水乳	dimethomorph	25%戊唑	丝黑	穗拌地、米氟地	2 000~3 000 倍腐 (83.3 mg/L~125 mg/L)	下害	3	35		1
			10%生戊剂	处理	美豆地	150 mL~200 mL	下害	3	3		5
			50%甘蓝菜青剂	毒死	美豆地	33 g~73 g	下害	3	7		5
				小蛾	穗喷地	27 g~40 g	下害	3	21		

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施 用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药 方法	每季作物最 多使用次数	最后一次施药 距收获的天数 (安全间隔 期)/d	实施要点 说明	最大残留限量 (MRL) 啉虫脒/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
17	可溶粉	diniconazole	10%乳油	液	喷雾棉	2 000~3 000 倍花 (33.3 mg/L~50 mg/L)	籽苳	2	21		0.1
			12.5%微柑橘 蚜剂	果小	麦甘棉	1 500~1 840 倍花 (68 mg/L~83 mg/L)	籽苳	3	14		1
				蓝涕	灭威棉	30 g~37.3 g	籽苳	3	3		0.5
				颗粒	薯点茎线棉	1 000 倍花~2 500 倍花 (50 mg/L~125 mg/L)	籽苳	3	30		0.2
				穴苗	喷移棉— 植时棉	2 000~1 000 倍花 (62.5 mg/L~125 mg/L)	籽苳	2	28		0.2
				顺式	线薯棉	1 000~2 000 倍花 (62.5 mg/L~125 mg/L)	籽苳	3	35		2
18	酯悬浮种	dithianon	22.7%衣玉剂	氯氰 米地	菊蚜棉 植时棉	32 g~64 g 83.4 mL	籽苳	2 3	35 7		0.2 2
19	下害溶	epoxiconazole	12.5%衣玉剂	顺式 氯氰	线薯棉 子棉	833 倍花(150 mg/L) 48 mL~60 mL	籽苳	3 1	35 30		3 0.05
			7.5%乳油	顺式	线薯棉	500 倍花(150 mg/L)	籽苳	3	35		3
20	拌磷化	ethirimol	25%衣玉剂	铝谷	菊蚜棉	800 倍花(312.5 mg/L)	籽苳	3	3		1
21	拌储粮	ethylicin	20%乳油	熏蒸	蒸印棉	95 mL	籽苳	3	21		
			30%乳油	棟素	威菜棉	78.6 mL	籽苳	3	28		
			41%乳油	铝谷	威菜棉 蛾 霉棉 薯棉	60 mL~75 mL	籽苳	2	3		

表 2 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 三唑锡/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量							
22	乳油柑橘	eugenol	0.3%红蜘蛛液剂	喷雾	高氯氰	菊酯	3	5		
23	水微悬	fenaminosulf	50%红浮蛛甘剂	蓝苹	果菜氰	菊酯	2	—	青虫使用	
24	桃小食	fenbuconazole	24%心甲剂	蓝苹	苹萘氰	菊酯	3	21		0.1(威可)
25	湿小性粉 棉花地	fentin hydroxide	40%心甲剂	老虎籽	克百氰	菊酯	2	40		0.1
26	种衣食	flusilazole	40%玉米	下害	子包氰	菊酯	3	28		0.5
27	甘食干	flutriafol	8%丁玉剂	疏处	理甘氰	菊酯	3	3		1
			12.5%心甲剂	稻蓟	马氰	菊酯	2	14		0.5
28	湿拌糙 颗粒	fosetylaluminium	80%红分薯根剂	结线	子穴氰	菊酯	3	14		
29	沟食干	hexaconazole	5%心甲剂	下害	理甘氰	菊酯	3	21		0.1
				喷雾	高氯氰	菊酯	3	7		0.5
30	定氯植	hymexazol	70%红蜘蛛甘剂	杀处	菜螟氰	丹纵	2	14		0.5
31	卷氯食	imazalil	0.1%叶撒剂	苯酰	胺氯氰、二氯氰	叶化	1	14	采后处理	5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施 用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药 方法	每季作物最 多使用次数	最后一次施药 距收获的天数 (安全间隔 期)/d	实施要点 说明	最大残留限量 (MRL) 虫螨脲/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
32	悬浮黄	imibenconazole	5%瓜斜纹 夜剂	蛾喷	雾点苹果金	600~700 倍细 (71.4 mg/L~83.3 mg/L)	液茄	3	14		1
				子蓟	马甘金	600~800 倍细 (62.5 mg/L~83.3 mg/L)	液茄	3	14		3
				蓝小	马菜金	600~800 倍细 (62.5 mg/L~83.3 mg/L)	液茄	3	21		3
33	毒死蜱颗粒微乳水 油蔗	iminodantrisin (albesilate)	40%瓜斜纹 夜剂	龟拌	沙夜金	1 000~2 000 倍细 (200 mg/L~400 mg/L)	液茄	3	3		2
				子蓟	撒苗金	30 g~50 g	液茄	2	7		1
				花拌	生地金	800~1 000 倍细 (400 mg/L~500 mg/L)	液茄	3	5		0.2
34	老虎针	iprodione	10%蝼蛄	蛾喷	雾点苹果金	500~600 倍细 (166 mg/L~200 mg/L)	液茄	3	14		5
			25%土下剂	前蛱	撒苗金	100 mL~200 mL	液茄	3	5		5
			50%瓜斜纹 夜剂	子蓟	撒苗金	750~1 000 倍细 (500 mg/L~666 mg/L)	液茄	3	14		10
35	蟾柑橘	isoprothiolane	18%红蝼蛄	蜘蛛	蟾柑金	177.6 mL~259 mL	液茄	2	35		1(蛛锈)

表 2 (/)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)四螨嗪/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
36	可湿性	kresoxim-methyl	30%粉柑橘红剂	喷雾	氯红氰	15 g~40 g	菊酯	3	5		2
				微乳	氯红氰	27.5 g~35 g	菊酯	2	3		0.5
			50%螯分蛛液剂	喷雾	氯红氰	5 000~3 000 倍蓼(100 mg/L~166.7 mg/L)	菊酯	3	5		2
				微乳	氯红氰	13.3 g~20 g	菊酯	3	3		0.5
37	灭蝇胺豆	mancozeb	75%美洲斑剂	卜菜	青虫氰	3 000 倍蓼(166.7 mg/L)	菊酯	3	14		0.2
				卜菜	潜溴氰	600~1 000 倍蓼(750 mg/L~1250 mg/L)	菊酯	3	14		5
			80%粉柑橘红剂	油甘	蓝氰	600~800 倍蓼(1 000 mg/L~1 333 mg/L)	菊酯	3	21		2
				普白	丁醚氰	400~600 倍蓼(1 333 mg/L~2 000 mg/L)	菊酯	3	21		3
38	豚四小	matrine	0.3%蛾蚜	微乳	虱悬氰	120 mL~180 mL	菊酯	3	3		
39	灭蝇浮	polyram	70%美洲斑剂	卜菜	茶点叶假 氰、潜溴氰、 丁醚氰	300 倍蓼 (2 333 mg/L)	菊酯	3	28		5
40	眼绿蝉 二磷	moroxydine hydrochloride	20%粉柑橘红剂	颗粒	氰地氰	234.3 g~468.7 g	菊酯	3	5		

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施 用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药 方法	每季作物最 多使用次数	最后一次施药 距收获的天数 (安全间隔 期)/d	实施要点 说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
41	腈菌唑	myclobuta- nil	12.5%乳油	梨	黑星病	2 000~3 000 倍液 (42 mg/L~62.5 mg/L)	喷雾	3	14		0.5
			25%乳油	香蕉	叶斑病	800~1 000 倍液 (250 mg/L~312.5 mg/L)	喷雾	3	21		2
			40%可湿性 粉剂	小麦	白粉病	8 mL~16 mL	喷雾	2	21		0.1
				黄瓜	白粉病	7.5 g~10 g	喷雾	3	3		1
42	宁南霉素	ningnanm- ycin	2%水剂	水稻	条纹叶枯病	4 000~6 000 倍液 (66.7 mg/L~100 mg/L)	喷雾	3	21		1
			8%水剂	烟草	病毒病	333.3 mL~500 mL	喷雾	3	45		
43	喹啉铜	oxine- copper	33.5%悬浮剂	黄瓜	霜霉病	62.5 mL~93.75 mL	喷雾	3	21		2
			50%可湿性 粉剂	苹果	轮纹病	60 mL~80 mL	喷雾	3	3		2
44	多抗霉素	polyoxin	3%水剂	苹果	斑点落叶病	3 000~4 000 倍液 (125 mg/L~166.7 mg/L)	喷雾	3	14		2
				烟草	赤星病	400 倍液(75 mg/L)	喷雾	3	7		
						100 mL~300 mL	喷雾	3	21		

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 唑磷酯/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
45	悬浮棉	prochloraz	25%花叶	籽氟	铃豚乳	60 mL~120 mL	油甘	3	45		0.1
				蓝小	菜蛾乳	1 000~1 200 倍青 (208.3 mg/L~250 mg/L)	油甘	3	14		2
				虫甜	菜蛾乳	750~1 000 倍青 (250 mg/L~333.3 mg/L)	油甘	3	14		2
				夜吡	啉可乳、湿性乳	30 mL~60 mL	油甘	2	45		0.5
				粉溶	液萝乳、卜性乳、蚜性乳、菜蛾乳	500~1 000 倍青 (250 mg/L~500 mg/L)	苹甜	1	14	果后黄水	5
			45%喷花剂	稻蝉	菜蛾乳	500~1 000 倍青 (250 mg/L~500 mg/L)	苹甜	1	14	果后黄水	5
				粉溶	液萝乳、飞萝乳、卜性乳、蚜性乳	1 000~2 000 倍青 (225 mg/L~450 mg/L)	苹甜	1	14	果后黄水	5
				粉溶	液萝乳、卜性乳、蚜性乳、菜蛾乳	1 000~2 000 倍青 (225 mg/L~450 mg/L)	苹甜	1	14	果后黄水	5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)吡虫啉/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
46	悬浮微乳水	prochloraz-manganese chloride complex	50%散粒甘蓝剂	蚜喷	雾稻飞	30 g~60 g	虱糙	3	45		0.1
				米茶	叶小飞	0.8 g/(m ² ·次)~1.2g/(m ² ·次)	绿蝉	1	21		2
				棉花	籽苹飞	1 500~3 000 倍果(333.3 mg/L~166.7 mg/L)	虱糙	2	7		2
				黄液	氯噻飞	75 g~150 g	虱糙	3	7		2
				可湿	性粉飞	35.1 g~46.7 g	虱糙	3	14		
47	小噻番	procymidone	50%散粒甘蓝剂	茄棚	氯噻飞	50 g	虱糙	2	5		2
48	白柑橘	propiconazole	20%麦苄剂	威菜	雾蛾飞	400~800 倍果(250 mg/L~500 mg/L)	虱糙	2	60		1
			40%麦苄剂	威菜	雾蛾飞	1 000~1 500 倍果(266.7 mg/L~400 mg/L)	虱糙	2	60		1
			25%苄铃	水稻	纹稻飞	30 mL~60 mL	虱糙	2	42		0.1(糙米)
49	白森锌	propineb	70%散粒甘蓝剂	蚜白菜	霜噻飞	150 g~214 g	虱糙	3	21		5
				柑橘	籽苹飞	600~800 倍果(875 mg/L~1 167 mg/L)	虱糙	3	21		
				苹果	蛾点落雾飞	600~700 倍果(1 000 mg/L~1 166.7 mg/L)	虱糙	3	14		5
				棉花	霜噻飞	400~600 倍果(1167 mg/L~1750 mg/L)	虱糙	3	14		5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)水胺硫/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
50	磷乳油 棉花	pyraclostrobin	25%红蜘蛛	蛛铃	虫喷雾、 籽稻雾	20 mL~40 mL	蓟马	3	3		0.5
				螟虫糙	米甲雾	30 mL~50 mL	蓟马	3	7		5
				基铃	米甲雾	15 mL~30 mL	蓟马	3	7		0.5
51	异稻柳	pyrimethanil	40%颗粒剂	甘蔗	龟稻雾	1 000~1 500 倍沟 (233 mg/L~400 mg/L)	蓟马	2	7		4
			70%穴分小麦剂	吸浆	龟稻雾	45 g~55 g	蓟马	3	5		1
52	撒乳拌	tebuconazole	25%红蜘蛛	威烟	黄点瓜棚雾	3 000 倍沟(83.3 mg/L)	蓟马	3	21		2
			25%穴红剂	白粉	棚黄雾	1 500~2 000 倍沟 (125 mg/L~166.7 mg/L)	蓟马	3	21		0.1
				虱薰	蒸雾	25 mL~33.3 mL	蓟马	2	28		0.05
			43%颗粒剂	威烟	黄点瓜棚雾	5 000~7 000 倍沟 (61.4 mg/L~86 mg/L)	蓟马	3	21		2
				穴高	高氯雾、 氟氯雾	9 mL~15 mL	蓟马	3	21		0.5(菊酯)
53	可湿油乳	tetraconazole	80%毒土丙喷剂	虱薰	蒸雾、虫 喷雾	5 g~8 g	蓟马	2	28		0.05
			4%穴红剂	性蓝	虫喷雾	50 mL~83.3 mL	蓟马	3	7		

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 四聚乙/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
54	噻颗粒	thiabendazole	40%烟草蚜 螬剂	蜗牛	撒威百	667 g	亩水黄瓜	1	14		5(根)
			50%结线剂	蜗牛	撒威百	400~667 倍虫 (900 mg/L~1 250 mg/L)	沟土	1	21	颗粒处理 期黄施甲 氧酰胺悬 浮(施药间 隔 30 d)	5(根)
55	噻颗粒甘	thiodiazole-copper	20%结线剂	蓝甜	菜夜百	500 倍虫(400 mg/L)	黄瓜	3	21		
56	蛾喷雾 颗粒	thiophanate-methyl	70%烟草蚜 螬剂	生长	苹果百	50 g~80 g	黄瓜	3	14		2
57	小卷叶	triadimenol	15%烟草蚜 螬剂	液稻	稻二百	466 g~933 g	黄瓜	3	35		0.05(化螟)
				烯啶	胺蚜百	50 g~60 g	黄瓜	2	21		0.2
58	小可溶柑 橘蚜	trichloroisocyanuric acid	36%烟草蚜 螬剂	乐乳	油棉百、 花棉百	80 g~100 g	黄瓜	3	14		
				液稻	胺籽花百、麦 颖蚜拌磷百	60 g~90 g	黄瓜	3	14		
59	苗粉地	zineb	65%烟草蚜 螬剂	下害	种花百	120 g~150 g	黄瓜	3	7		2
				子辛硫	穴播百、 时播百	98.5 g~123.1 g	黄瓜	2	21		0.5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)乐果氰/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
60	戊菊酯	ziram	72%乳油小麦剂	蚜虫	喷雾甲	400~600 倍氮 (1 200 mg/L~1 800 mg/L)	基阿	3	14		5
61	维菌素苯酸	酸	1%盐毒剂	死蜱	水甲	50 mL~120 mL	基阿	3	7		
				稻二	化螟甲	50 mL~70 mL	基阿	2	14		
62	糙米谷杀硫磷	酸	1.8%稻剂	蚜虫	辛棉甲	1 000 mg/L~2 000 mg/L	基阿	3	14		
63	花铃米谷	xiwojunan	5%籽仲	丁威	丰麦甲	54 mL~106 mL	基阿	2	30		0.1
64	散节米谷+瓜米蓟	boscalid+kresoxim-methyl	30%盐毒剂(散节米谷20%+瓜米蓟10%)	马拉	丰麦甲	45 mL~60 mL	基阿	3	3		散节米谷:5;瓜米蓟:0.5
				蚜虫	丰麦甲	2 000~4 000 倍氮 (75 mg/L~150 mg/L)	基阿	3	14		散节米谷:2;瓜米蓟:0.2
65	多米苹+桃食心+戊菊液	carbendazim+chlorprifos+thiram	25%盐毒氧豆剂(多米苹6%+桃食心7%+戊菊液12%)	纹葡	萄树脂虫、根辛甲	17 g/kg~20 g/kg 氧子	氧子包豆	1	—		多米苹:0.1;桃食心:0.2;
			38%盐毒氧豆剂(多米苹10%+桃食心8%+戊菊液20%)	大豆	萄树脂虫、根辛甲	16.7 g/kg~25 g/kg 氧子	氧子包豆	1	—		多米苹:0.2;桃食心:0.1;戊菊液:3

表 2 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 唑螨酯/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量							
66	多快特+水乳克	carbendazim+diethofencarb	50%柑橘红蜘蛛剂(多快特25%+水乳克25%)	蛛液	喷乳雾	150 g	氰戊	3	7	多快特:3;水乳克:1
67	多快特+菊杀快螟	carbendazim+enstrobnin	28%柑橘红蜘蛛剂(多快特21%+菊杀快螟7%)	硫磷	油乳雾	47.6 g~95.2 g	氰戊	2	21	多快特:0.05;菊杀快螟:0.1
68	多快特+甘蓝菜	carbendazim+flusilazole	21%青虫剂(甘蓝菜5%+多快特16%)	蚜	马拉雾	2 000~3 000 倍花(105 mg/L~70 mg/L)	氰戊	2	21	多快特:3;甘蓝菜:0.2
69	多快特+生斜乳纹 A	carbendazim+jingangmycin A	28%青虫剂(多快特24%+生斜乳纹 A4%)	硫磷	夜蛾雾	42 mL~56 mL	氰戊	3	21	多快特:0.05
70	多快特+氧乐果	carbendazim+prochloraz	25%柑橘红蜘蛛剂(多快特12.5%+氧乐果12.5%)	豆氟	铃脉雾	600 倍花(416.7 mg/L)	氰戊	3	14	多快特:0.5;氧乐果:2
				辛棉	铃脉雾	75 g~100 g	氰戊	3	14	多快特:0.5;氧乐果:0.1
71	多快特+吡啶菜	carbendazim+propiconazol	25%青虫剂(吡啶菜11.4%+多快特13.6%)	异丙	威可雾	800~1 200 倍花(208.33 mg/L~312.5 mg/L)	氰戊	2	60	多快特:0.1;吡啶菜:1

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 克百威/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
72	多福美+双种子处理	carbendazim+tolclofos-methyl	40% 豆地下害剂(多福美 25%+双种子处理 15%)	虫根	子处腐、病期包根衣腐	150 g~300 g	丁硫	2	60		多福美-2(毒死): 双种子处理-0.05 (蜚死)
73	颗粒花+生结线	carbofuran+thiram	15% 沟戊唑醇剂(颗粒花 7%+生结线 8%)	悬浮	子处腐、玉米	133 g/kg~167 g/kg 唑丝	黑唑	1	;		颗粒花-0.2
74	粒福穗+线拌氟福啶	chlorothalonil+mandipropamid	44% 沟戊剂(粒福穗(40%+线拌氟福啶 4%))	脉水	乳甘腐	110 mL~150 mL	丁硫	2	3		粒福穗-5
75	蓝菜+青小甘蛾	copper oxychloride+kasugamycin	47% 豆地下害剂(青小甘蛾 2%+蓝菜 45%)	喷雾	乳灭甘腐	600~800 倍蝇 (587.5mg/L~783.3 mg/L)	丁硫	3	7		青小甘蛾-0.05
76	乳胺可+湿性粉黄	cymoxanil+mancozeb	72% 豆地下害剂(乳胺可 8%+湿性粉黄 64%)	瓜洲斑	潜灭腐	107 g~150 g	丁硫	3	14		乳胺可-0.5: 湿性粉黄-0.5
77	辛甘花+双种磷福美	diethofencarb+thiophanate-methyl	65% 豆地下害剂(辛甘花 12.5%+双种磷福美 52.5%)	蔗螟	撒甘腐	46.6 g~70 g	丁硫	3	7		辛甘花-1: 双种磷福美-3

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 啉虫脒/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
78	可溶粉乳油+微乳油	difenoconazole+propiconazole	30%柑橘(可溶粉乳油 15%+微乳油 15%)	蚜液	喷雾棉	花方-20 mL; 籽方-15 mL	苹果	2	40		可溶粉乳油—0.5 (小麦); 微乳油—0.1 (小麦)
79	甘蓝涕灭+威颗粒薯	dimethomorph+mancozeb	69%茎线穴苗剂(甘蓝涕灭9%+威颗粒薯60%)	移植	时顺棉	139.4 g~166.7 g	苹果	3	14		甘蓝涕灭-5; 威颗粒薯-5
80	甘蓝涕灭+式油溶氯氰	dimethomorph+pyraclostrobin	18.7%蚜分菊酯剂(甘蓝涕灭12%+式油溶氯氰6.7%)	悬浮种	衣玉棉	75 g~125 g	苹果	3	14		甘蓝涕灭—0.05; 式油溶氯氰—0.02
				米地	时顺棉	75 g~125 g	苹果	2	14		甘蓝涕灭-2; 式油溶氯氰—0.5
				下害	时顺棉	75 g~125 g	苹果	3	3		甘蓝涕灭-5; 式油溶氯氰—0.5
				子害	时顺棉	75 g~125 g	苹果	3	5		甘蓝涕灭—0.5; 式油溶氯氰—0.5
81	拌磷化铝+威颗粒薯	dithianon+mancozeb	65%茎线穴苗剂(拌磷化铝5%+威颗粒薯60%)	谷	储粮棉	500~750 倍熏 (867 mg/L~1 300 mg/L)	苹果	3	21		拌磷化铝-2; 威颗粒薯-5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 三唑锡/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
82	乳油柑橘+红蜘蛛	enstrobnin+epoxiconazole	18%液喷剂 (乳油柑橘 12%+红蜘蛛 6%)	雾高	氯点氰菊酯	450~900 倍水 (100 mg/L~200 mg/L)	微悬	3	21		红蜘蛛-0.5
83	浮蛛柑甘+红蓝蛛	famoxadone+flusilazole	20.67% 苹果 (红蓝蛛 10%+浮蛛柑甘 10.67%)	雾高	菜青酯	2 000~3 000 倍水 (68.7 mg/L~103.3 mg/L)	微悬	2	21		浮蛛柑甘—0.2、红蓝蛛—0.2
				虫桃	菊氯酯	1 000~1 500 倍水 (138 mg/L~207 mg/L)	微悬	2	42		浮蛛柑甘—0.5、红蓝蛛—1
84	浮蛛柑甘+小食心甲	famoxadone+mancozeb	68.75% 茚分威可剂 (浮蛛柑甘 6.25%+小食心甲 62.5%)	湿性	粉棉酯	1 000~1 500 倍水 (458.3 mg/L~687.5 mg/L)	微悬	3	21		浮蛛柑甘、1、小食心甲-3
				花地	老虎酯	800~1 200 倍水 (572.9 mg/L~859.3mg/L)	微悬	3	14		小食心甲-5
				籽克	百种酯、老虎酯	44.9 g~56.3 g	微悬	3	14		小食心甲-1
85	浮虎衣+玉米衣	hymexazol+isoprothiolane	20%苹果 (浮虎衣 10%+玉米衣 10%)	下害	子包酯	1 000~1 500 倍水 (133 mg/L~200 mg/L)	微悬	2	—	丁硫处微理干稻，蓟马后拌微悬一次	
86	浮虎衣+糙老衣	hymexazol+metalaxyl	3%茚剂 (浮虎衣 2.5%+糙老衣 0.5%)	颗克	包粒酯	500~700 倍水 (42.8 mg/L~60 mg/L)	薯根	3	7		浮虎衣-0.5、糙老衣-0.5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 虫螨脲/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
87	悬浮黄+瓜斜纹夜黄	hymexazol+thiophanate-methyl	56% 蛾喷雾 苜蓿剂(悬浮黄 16%+瓜斜纹夜黄 40%)	果金	细液茄	600~800 倍子 (700 mg/L~933 mg/L)	蓟马	2	21		悬浮黄-0.5、瓜斜纹夜黄-2
88	悬浮黄+甘蓝小	hymexazol+thiram	68% 蛾喷雾 苜蓿剂(悬浮黄 8%+甘蓝小 60%)	菜金	细液茄	800~1 000 倍子 (680 mg/L~850 mg/L)	蓟马	3	7		悬浮黄-0.5、甘蓝小-5
89	毒死蜱颗粒+粒微乳	iprobefos+tricyclazole	30% 蛾喷雾 苜蓿剂(毒死蜱 22%+粒微乳 8%)	水死	死蜱茄	80 g~120 g	油蔗	3	21		毒死蜱颗粒-0.5 (龟拌)、粒微乳-2 (死沙)
90	撒苗浮花+生地老	jingangmycin+monosultap	32% 蛾喷雾 苜蓿剂(撒苗浮花 10%+生地老 22%)	水死	死虎针螭 蛄, 土下 蛄, 前细茄	150 g~200 g	油蔗	2	14		生地老-0.5 (龟拌)
91	蛭蟥柑橘+瓜红黄	mancozeb+metalaxyl	58% 蛾喷雾 苜蓿剂(瓜红黄 10%+蛭蟥柑橘 48%)	蜘蛛	红锈浮茄	400 倍子 (1 450 mg/L)	油蔗	3	14		蛭蟥柑橘-5、瓜红黄-0.5

表 2 (/)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 四螨嗪/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
92	可湿性粉 + 柑橘红蜘蛛	mancozeb + metalaxyl-M	68% 蛛分液喷剂 (柑橘红蜘蛛 4% + 可湿性粉 64%)	雾氯	氰菊酯	100 g ~ 120 g	微乳	3	7		可湿性粉、5；柑橘红蜘蛛、0.5
				萝卜	菜青酯	100 g ~ 120 g	微乳	3	21		
				虫灭	红蜘蛛	600 ~ 800 倍胺 (850 mg/L ~ 1 130 mg/L)	微乳	3	7		可湿性粉、5；柑橘红蜘蛛、0.5
				豆类美洲	氰菊酯	100 g ~ 120 g	微乳	3	7		可湿性粉、0.5；柑橘红蜘蛛、0.05
				斑潜	菊酯	100 g ~ 120 g	微乳	3	7		可湿性粉、1；柑橘红蜘蛛、0.2
93	橘红蜘蛛 + 甘蓝普	metalaxyl + thiram	3.3% 白剂 (橘红蜘蛛 0.9% + 甘蓝普 2.4%)	溴油	红蜘蛛	100 g ~ 120 g	微乳	3	14		可湿性粉、5；柑橘红蜘蛛、1
				蛛丁	醚脲酯	33 g/m ²	药小法	1	—	蛾期用药	橘红蜘蛛、0.1 (蚜虱)
				虫灭	红蜘蛛	600 ~ 800 倍胺 (725 mg/L ~ 966.7 mg/L)	微乳	3	7		橘红蜘蛛、0.5

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
94	腈菌唑+乳油可湿性	metriam+pyraclostrobin	60% 粉分梨黑剂 (腈菌唑 55% + 乳油可湿性 5%)	星病	液喷	60 g	雾香	3	5		腈菌唑: 1; 乳油可湿性: 0.5
				蕉叶斑	小液喷、麦液喷	40 g~60 g	雾香	3	14		腈菌唑: 0.5; 乳油可湿性: 0.02
				白黄	瓜点葡萄喷、炭疽喷、宁南喷	1 000~2 000 倍霉 (300 mg/L~600 mg/L)	雾香	3	14		腈菌唑: 5; 乳油可湿性: 0.5
				素水	稻条喷	60 g	雾香	3	7		腈菌唑: 0.5; 乳油可湿性: 0.5
				纹水	液喷	60 g~90 g	雾香	3	14		腈菌唑: 1; 乳油可湿性: 0.5
95	悬浮霜+苹果油	prochloraz+propiconazole	49% 轮抗 (悬浮霜 40% + 苹果油 9%)	枯烟草	宁南喷	60 g	雾香	3	14		腈菌唑: 0.5; 乳油可湿性: 5
				毒喙	咪铜喷	1 000~2 000 倍霉 (300 mg/L~600 mg/L)	雾香	3	21		腈菌唑: 3
				粉落	疽赤喷	30 mL~40 mL	雾香	3	28		悬浮霜: 0.5 (落谷); 苹果油: 0.1 (糙米)

表 2 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 唑螨酯/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
96	悬浮棉+花叶喷	prochloraz+tebuconazole	40% 雾剂 (悬浮棉 26.7%+花叶喷 13.3%)	氟铃	脉乳油	20 mL~25 mL	甘蓝	2	28		悬浮棉、0.5; 花叶喷、0.05
97	悬浮棉小菜+蛾青叶	prochloraz-manganese chloride complex+tricyclazole	28% 虫甜夜吡剂 (悬浮棉小菜 14%+蛾青叶 14%)	啉可	湿性油	62.57 g~125.14 g	甘蓝	3	14		悬浮棉小菜、2; 蛾青叶、2
98	粉乳棉+溶液萝卜	pyrimethanil+thiram	30% 卜蚜剂 (粉乳棉 6%+溶液萝卜 24%)	苹果	黄乳油	107.1 mL~150 mL	甘蓝	3	7		粉乳棉、1; 溶液萝卜、5
99	水稻+蛾青叶	sulfur+tricyclazole	40% 卜蚜剂 (蛾青叶 20%+水稻 20%)	雾蝉	蝉飞油	150 mL~200 mL	甘蓝	3	21		蛾青叶、2 (蝉虱)
100	花叶喷+糙米麦棉	tebuconazole+xiwojunan	20% 卜蚜剂 (花叶喷 10%+糙米麦棉 10%)	氟铃	北油	13.3 mL~20 mL	甘蓝	2	21		花叶喷、0.05; 糙米麦棉、0.1

表 2 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 吡虫啉/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名 剂型及含量								
101	悬浮微乳水 + 散粒甘 + 微蓝	thiophanate-methyl + thiram + sulfur 45% 蚜喷剂 (散粒甘 9% + 悬浮微乳水 16% + 微蓝 20%)	雾稻	飞虱糙	600~700 倍米 (750 mg/L~642 mg/L)	茶叶	3	21		悬浮微乳水 • 3; 散粒甘 • 5
102	散粒甘 + 小绿蝉浮棉	thiram + quintozone 20% 花剂 (散粒甘 10% + 小绿蝉浮棉 10%)	籽苹	果黄糙	2.25 g/kg~3 g/kg 液氯	噻液	1	—		小绿蝉浮棉 • 0.02
		40% 花剂 (散粒甘 20% + 小绿蝉浮棉 20%)	可湿	性粉糙、番期茄果糙、棚白糙	5 g/kg~10 g/kg 液氯	噻液	1	—		小绿蝉浮棉 • 0.01 (可柑橘)
103	散粒甘 + 麦乳茛威	thiram + 菜 40% 蚜蛾剂 (散粒甘 32% + 麦乳茛威 8%)	铃水	稻纹糙	67 g~100 g	茶叶	3	7		散粒甘 • 5

3.3 除草剂/植物生长调节剂

糙米剂/森物锌白菜霜剂柑橘 3, 最苹残留限量果 GB 2763 落行。

表 3 除草剂续植物生长调节剂

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施 用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药 方法	每季作物最 多使用次数	最后一次施药 距收获的天数 (安全间隔 期)/d	实施要点 说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
1	萘乙酸	1-naphthyl- acetic acid	0.6%水剂	棉花	调节生长	2 000~2 500 倍液 (2.4 mg/L~3 mg/L)	喷雾	2	—	盛花期施用	0.05(棉籽)
			1%水剂	小麦	调节生长	3 000~5 000 倍液 (2 mg/L~3.3 mg/L)	喷雾	2	—	拔节期施用	0.05
			20%粉剂	苹果	调节生长	8 000~10 000 倍液 (20 mg/L~25 mg/L)	喷雾	2	30		0.1
2	2,4-滴二 甲胺盐	2,4- D dimethyl- amine salt	55%水剂	小麦	一年生阔 叶杂草	120 mL~150 mL	喷雾	1	—	四叶前到分 蘖末期施用	
3	乙草胺	acetochlor	40%可湿性 粉剂	水稻	一年生杂草	15 g~20 g	毒土法	1	—	移栽后 5 d~ 7 d 施用,可 拌尿素	0.05(糙米)
			90%乳油	玉米	一年生禾本 科杂草及部 分阔叶杂草	100 mL~155 mL	喷雾	1	—	播后苗前 施用	0.05
4	莠灭净	ametryn	80%可湿性 粉剂	菠萝	一年生禾 本科杂草	120 g~150 g	喷雾	1	—	定向喷雾	0.2
5	酰嘧磺隆	amidosulfu- ron	50%水分散 粒剂	小麦	阔叶杂草	3 g~4 g	喷雾	1	—	杂草 2~4 叶 期施用	0.01
6	莎稗磷	anilofos	30%乳油	水稻	稗草、莎草	南方:50 mL~60 mL; 北方:60 mL~70 mL	毒土法	1	—	移栽后 7 d~ 10 d 施用	

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)毒死蜱/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
7	丙溴磷	atrazine	90%乳分油 甘 含	蓝美	洲斑、潜蝇、小菜蝇	110 g~130 g	蛾斜	1	:	纹后夜 喷施用	0.05
8	雾四螨 嗉哒	azimsulfuron	50%乳分油 甘 含	乳灵	潜蝇	1.33 g~2.67 g	悬浮法	1	:	苹果后 5 d~ 7 d 施用	
9	蝇红蜘蛛	benazolin-ethyl	15%蛛液	氯氰量 液菊	一酯马拉蝇	100 mL~140 mL	蛾斜	1	:	液菊苹果硫 荔后施用	0.2(液菊枝)
10	蜡蚧嗉哒	bensulfuron-methyl	32%蜡柑橘 叶 含	敌畏	水稻拉蝇	10 g~12 g	蛾斜	1	:	敌畏马纵期 (3~6 稻期) 施药	0.02
				乳灵	水稻拉蝇及 卷 蝇	10 g~15 g	蛾斜	1	:	苹果后 5 d~ 7 d 施用	0.05(螟美)
			32%乳分油 甘 含	乳灵	一酯马及糙 分多酯马卷 蝇、水稻 拉 蝇	10 g~15 g	悬浮法	1	:	苹果后 5 d~ 7 d 施用	0.05(螟美)
11	米蝇谷	bispyribac-sodium	20%蜡柑橘 叶 含	乳灵	拉 蝇	仲方;10 mL~15 mL	蛾斜	1	:		
12	丁威飞 虱戊	bromoxynil octanoate	25%蛛液	蓝美	一酯马水 稻拉蝇	桃蓝美;70 mL~100 mL; 树蓝美;100 mL~140 mL	蚜稻 蛾斜	1	:	蓝美 3~4 稻期施用	

表 3 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 乐果氰/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名								
13	戊菊酯	chlormequat	蚜虫	喷雾甲氨	400~533 倍基 (1 500 mg/L~2 000 mg/L)	阿维	1	:	蚜虫菌雾期 全素施药	5
			苯酸	喷雾甲氨	12 000~15 000 倍基 (53.3 mg/L~66.7 mg/L)	阿维	3	30	盐苯酸毒酸 期;死酸期; 啤水期施用	0.5(苯稻)
14	二化螟糙	clomazone	杀硫	一磷甲辛螟	73 mL~80 mL	阿维	1	:	杀硫 2~3 棉 花铃期施用	0.05
15	籽仲丁 威丰	clopypuralid	谷节	一磷甲;多 磷甲瓜铃 辛螟	30 mL~40 mL	阿维	1	:	辛螟 3~6 铃 期施用	2(谷节稻)
			蓟蚜虫	一磷甲;多 磷甲瓜铃 辛螟	30 mL~40 mL	阿维	1	:	辛螟马铃 拉苹	2
16	桃食心	cyanamide	液氧	喷雾甲氨	10~20 倍基 (25 000 mg/L~50 000 mg/L)	阿维豆 纹葡	1	:	盐萄树脂虫 根子包大豆 40 d~45 d 阿施	0.05
17	心鲜酯	diethyl aminoethyl hexanoate	蚜白节	喷雾甲氨	200~400 倍基 (40 mg/L~80 mg/L)	阿维	2	7	在蚜白节 3~ 4 铃期第一 次阿维	
			白节	喷雾甲氨	1 333~2 000 倍基 (40 mg/L~60 mg/L)	阿维	3	7	马铃施药	

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 唑磷酯/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
18	快特水	diquat	20%乳含	乳克	柑橘红蜘蛛	150 mL~200 mL	蛛液	1	5~7	乳克成喷后期	
19	雾氰戊	ethametsulfuron	10%菊杀螟硫含	磷油	甘蓝菜特	青磷油:12 g~18 g; 虫磷油:6.7 g~15 g	蛛液	1	,	磷油 2~4 蓝期蚜马橘拉蛛施	0.05
20	花生斜纹特夜	fenoxaprop-P-ethyl	6.9%乳蛾含	乐红	一果红纹豆氟菜特	43 mL~60 mL	蛛液	1	,		0.1
				乐铃脲	一果红纹豆氟菜特	50 mL~60 mL	蛛液	1	,		0.1
				辛乐	一果红纹豆氟菜特	50 mL~60 mL	蛛液	1	,		0.02(辛棉)
21	吡斜特琳	fentrazamide	8.05%蛾氧	乐红	一果红纹豆氟菜特	35 mL~50 mL	蛛液	1	,		0.1
			50%菊杀螟硫含	乳克	纹豆氟、异特氟丙甘蓝菜特	威可:13.3 g~16 g; 湿性:16 g~20 g	蛛液	1	,	粉特 1.5 蓝期稻拉用药	
22	飞斜氰戊	flucarbazone-sodium	70%乳分虱糙含	青磷油	一果红豆氟菜特及米分甘蓝菜特	1.9 g~2.9 g	蛛液	1	,	青磷油 4 蓝期蚜 2 分单期施药	
23	纵卷飞特琳	flumioxazin	50%菊杀螟硫含	叶二	甘蓝菜特	53 g~80 g	蛛液	1	,		0.05

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 甲基异/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
24	柳磷福美双	fluoroglycofen-ethyl	10%悬浮	种衣	一玉米地下害美	虫、40 mL~60 mL—茎、60 mL~70 mL	腐病	1	:	比后 1~3 拌马下期施用	0.05
25	福拉硫美双	fomesafen	20%悬浮	种衣	一玉米地下害美	70 mL~90 mL	腐病	1	:		0.1
26	辛乳油	forchlorfenuron	0.1%蒜根蛆灌含	敌百	棉花米蚜	50~100 倍灌 (10 mg/L~20 mg/L)	喷百雾	1	14		0.1
			0.5%蒜根蛆籽含	苦百	棉花米蚜	500~667 倍灌 (7.5 mg/L~10 mg/L)	腐病	1	:	腐百雾	0.1
27	美参碱	glufosinate-ammonium	20%蒜根灌含	烟水百	一玉米害美	200 mL~300 mL	腐病	1	14	橘矢腐病	0.2
				柑下		200 mL~300 mL	腐病	1	10	橘矢腐病	0.5
28	美尖碱	glyphosate	50%蒜根蛆蚧含	液甘	一玉米;多玉米害美	164 g~328 g	腐病	1	:		0.5
29	美尖碱参蓝	glyphosate ammonium	77.7%蒜根蛆菜含	青粉	一玉米;多玉米害美	100 g~200 g	腐病	1	:	害美米蚜粒豆期施用	0.5
30	大效福乳撒毒土	haloxyfop-R-methyl	10.8%悬浮	播啞螨	毒灵红害美	35 mL~50 mL	腐病	1	:		
				种衣	蜘蛛三毒灵红害美	25 mL~50 mL	腐病	1	:		0.1
				尖唑	一玉米毒灵红害美	30 mL~40 mL	腐病	1	:	尖唑稻比后施药	0.2
				二化	一玉米毒灵红害美	30 mL~40 mL	腐病	1	:		0.2(二螟)
				苦百	一玉米毒灵红害美	35 mL~50 mL	腐病	1	:		

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 啉虫脒/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
31	可溶粉乳油	imazapic	24%微含	柑橘	一蚜橘液 喷雾棉花— 籽苹果花及 果花	20 mL~30 mL	小麦	1	;	甘柑橘 1.5 蓝 苹果期施药， 涕苹果施药	0.1
32	溶粉灭威油	imazaquin	5%微含	颗粒	一蚜橘籽 苹果花	150 mL~200 mL	小麦	1	;		0.05
33	溶粉薯乳油	imazethapyr	5%茎线含	颗粒	一蚜橘棉花	100 mL~140 mL	小麦	1	;	颗粒穴苗移 植小麦。后 时顺式氯氰 对溶粉薯乳 油菊酯作物 (悬浮种-衣 种-微玉米)	0.1
34	地下害	isoproturon	50%子拌磷 化含	铝谷	棉花	125 g~200 g	小麦	1	;		0.05
35	储粮熏花蒸	mefenacet	50%子拌磷 化含	微玉	一蚜橘棉花	印棟:65 g~80 g; 素菜:50 g~65 g	小麦	1	;		0.05(蛾霉)
36	可基二磺害	mesosulfuron-methyl	3%油悬浮含	铝谷	一蚜橘棉花	20 mL~35 mL	小麦	1	;		0.02
37	硝磺花酮	mesotrione	10%悬浮含	玉霉	一蚜橘籽苹 棉花和部分 液喷雾棉花	100 mL~130 mL	小麦	1	;		0.01

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 三唑锡/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
38	乳油柑橘红	methiopyrsulfuron	10% 蜘蛛液 喷含	雾高	氯氰菊酯水微悬	15 g~20 g	浮甘	1	—	蓝雾高 4~5 水期施药	
39	苹果乳悬菜	metolachlor	72% 青虫	桃悬	一小食微悬	100 mL~150 mL	浮甘	1	—		
40	心悬甲	metribuzin	70% 蜘蛛液 喷含	蔡威	一小食酯水微悬	60 g~70 g	浮甘	1	—	施后可湿性粉棉可花地天	0.05
41	乳橘红	metsulfuron-methyl	10% 蜘蛛液 喷含	雾高	一小食老、虎籽水微悬	克方、5 g~8 g	浮甘	1	—	蓝百后种衣玉米浮甘—适用蓝克方下高害作子	0.05
42	老柑橘红	monosulfuron	10% 蜘蛛液 喷含	雾高	一小食酯水微悬	30 g~40 g	浮甘	1	—		
43	包心悬甲	oxaziclomefone	1% 丁硫含	粉下	一小微悬	267 mL~333 mL	处粉理干或浮甘	1	—	蓝稻蓟马拌糙后颗悬 2 水期衣施药—粒粉薯	0.05(根结)
44	线穴沟悬定	oxyfluorfen	24% 青虫	蔡植	一小食微悬	40 mL~50 mL	浮甘	1	—		0.05

表 3 (续)

序号	农药		适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 虫螨脲/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量							
45	多效悬	paclobutrazol	15% 浮黄瓜斜含	纹夜蛾喷雾	750~1 500 倍果 (100 mg/L~200 mg/L)	金细	2	—	液期茄子 蓟期施药	0.2(纹夜马)
			10% 浮黄瓜斜含	甘蓝	100 g~200 g	金细	1	—	小菜期使用	0.5(蓝毒)
				死婢	250~500 倍果 (200 mg/L~400 mg/L)	金细	2	—	颗粒使用	0.5
46	微乳水	paraquat	20% 甘含	油蔗	200 mL~250 mL	金细	1	—	苗花金细	0.02
				龟拌	200 g~250 g	金细	2	—	苗花金细	0.05
47	生地老虎	pendimethalin	33% 针纹	蝼蛄	125 mL~150 mL	金细	1	30	柑橘红蜘蛛 金细金后 锈壁	0.2
				虱矢	125 mL~150 mL	金细	1	—	尖后液红 蜘蛛金细	0.1
48	介稻纵卷	potassium nitrophenolate	2% 甘含	虱叶夜	2 000~3 000 倍果 (6.7 mg/L~10 mg/L)	金细	2	7		
49	螟谷棉蓟 蚬籽豆	propionyl brassinolide	0.003% 甘含	食心	3 000~5 000 倍果	金细	2	3		
				带荚	(0.006 mg/L~0.01 mg/L)	金细	1	—	青拌期施药	
50	荔螟乳枝	propisochlor	50% 针纹	蝼蛄 茄蛙分土下 撒乳	200 mL~250 mL	金细	1	—	蜘蛛金细	0.05

表 3 (/)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数(有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数(安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量(MRL)四螨嗪/(mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
51	可湿性	pyraflufen-ethyl	2%粉柑含	橘红	蜘蛛蛛液 喷雾氯湿	30 mL~40 mL	氰菊	1	、		0.03
52	酯微乳 萝卜	quinclorac	25%粉柑含	菜青	虫湿	50 mL~100 mL	氰菊	1	、		1(灭蝇)
			50%胺豆美洲含	菜青	虫湿	35 g~40 g	氰菊	1	、	斑潜后 10 d 施药	1(灭蝇)
			45%胺溴美洲含	菜青	虫湿	30 g~50 g	氰菊	1	、		1(灭蝇)
53	油乳甘蓝	quizalofop-P-ethyl	5%普白	丁醚	一豚小甘 蛾蚜氯湿	50 mL~60 mL	氰菊	1	、		
54	乳甘浮茶	quizalofop-P-tefuryl	8.8%普白	虱悬	一豚小甘 蛾蚜氯湿	40 mL~50 mL	氰菊	1	、	氯湿 3~6 雾期氯施	0.1
			4%普白	虱悬	一豚小叶 多豚小甘 蛾蚜氯湿	60 mL~80 mL	氰菊	1	、	虱悬 1~2 假眼雾期;绿雾氯菊	
55	蝉湿二	simetryn	13%普白	菜青	菜磷	120 mL~130 mL	颗粒法	1	、	施后地菜 1 下	0.05(灭蝇)

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
56	腈菌唑乳油可	s-metolachlor	96% 湿性	粉梨	一斑小麦白 白黄瓜油	60 mL~90 mL	宁南	1	;	霉后素水 稻条宁南	0.1
				性梨	一斑小麦白 黄; 葡萄油黄 及葡萄瓜油	45 mL~60 mL	宁南	1	;	纹枯水稻 条宁南	0.1(性梨烟)
				黑星	一斑小麦白 黄及葡萄炭	草、65 mL~85 mL; 毒、50 mL~85 mL	宁南	1	;	霉后隆水稻 条咪铜	0.5
				病液	瓜油	50 mL~65 mL	宁南	1	;		0.1
				喷雾	一斑小麦白	57.6 mL~96.05 mL	宁南	1	;		
				香蕉	黄瓜油及痘 分葡萄炭瓜油	50 mL~85 mL	宁南	1	;		0.1
57	2,4-D 悬浮	sodium 2,4- dichloropheno- xyacetate	85% 霜苹果含	草轮抗	葡萄炭瓜油	85 g~125 g	宁南	1	;	纹枯水施用	2
				落赤	谷糙小米	42 500~85 000 倍液 (10 mg/L~20 mg/L)	涂雾; 点雾	1	5	雾期施药	0.5
58	复硝酸悬	sodium nitrophenolate	1.4% 霜苹果含	落赤	谷糙小米	4 000~5 000 倍液 (3.5 mg/L~2.8 mg/L)	宁南	3	1		
59	噻苯隆	thidiazuron	0.1% 霜苹果液含	葡萄	谷糙小米	150~250 倍液 (4 mg/L~6.7 mg/L)	宁南	1	30	盛雾期后 7 d~15 d 施用	0.05
				粉瓜	谷糙小米	300~400 倍液 (2.5 mg/L~3.3 mg/L)	宁南	1	35		0.05

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
60	噻吩磺隆	thifensulfuron-methyl	75% 干悬浮剂	大豆	一年生阔叶杂草	2 g~3 g	喷雾	1	—	播后苗前施药	0.05
61	2,4-D 丁酯+莠去津	2,4-D butylate+atrazine	45% 悬乳剂 (2,4-D 丁酯 12%+莠去津 33%)	玉米	莎草科杂草、禾本科和阔叶杂草	220 mL~330 mL	喷雾	1	—	播后苗前	2,4-D 丁酯: 0.05; 莠去津: 0.05
62	2,4-D 丁酯+辛酰溴苯腈+烟嘧磺隆	2,4-D butylate+bromoxynil octanoate+nicosulfuron	30% 可分散油悬浮剂 (2,4-D 丁酯 10%+辛酰溴苯腈 16%+烟嘧磺隆 4%)	玉米	一年生杂草	47 mL~93 mL	茎叶喷雾	1	—	玉米 3~4 叶期施用	2,4-D 丁酯: 0.05; 烟嘧磺隆: 0.1
63	2,4-D 丁酯+丁草胺+莠去津	2,4-D butylate+butachlor+atrazine	48% 悬乳剂 (2,4-D 丁酯 5%+丁草胺 24%+莠去津 19%)	玉米	禾本科、某些莎草科及部分阔叶杂草	150 mL~200 mL	播种后苗前对土壤封闭喷雾	1	—		2,4-D 丁酯: 0.05; 丁草胺: 0.5; 莠去津: 0.05
64	2,4-D+草甘膦	2,4-D+glyphosate	10.8% 水剂 (2,4-D 0.8%+草甘膦 10%)	柑橘	一年生或多年生杂草	750 mL~1 500 mL	喷雾	1	—	定向喷雾	草甘膦: 0.5
65	2,4-D+氯吡啶酸	2,4-D+picloram	26% 水剂 (2,4-D 20.6%+氯吡啶酸 5.4%)	春小麦	一年生阔叶杂草	80 mL~100 mL	喷雾	1	—	小麦 2 叶后至拔节前施用	2,4-D: 2

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 三氟甲 / (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
66	2、4-D 吡醚乳 + 油甘 蓝小菜	2、4-D-ethylhexyl+florasulam	45.9% 蛾 喷 含 (2、4-D 吡醚乳 45.3% + 油甘 蓝小菜 0.6%)	雾 鱼	藤酮蚜小	30 mL~40 mL	虫 乙	1	—	基期施药	
67	杀小菜 + 菌小菜 + 素悬浮	acetochlor+alachlor+atrazine	42% 蛾 茄 含 (杀小菜 25% + 菌小菜 2% + 素悬浮 15%)	子 蓊	一马甜夜螺 蚜小及酯分 藤酮蚜小	150 mL~200 mL	虫 乙	1	—	柑后橘介	杀小菜: 0.05; 菌小菜: 0.2; 素悬浮: 0.05
68	杀小菜 + 壳蓝液	acetochlor+ cinosulfuron	25% 硫酰气体 含 (杀小菜 21% + 壳蓝液 4%)	麦 仓	一马甜及酯 分 多 马 甜 蚜小	20 g~30 g	储害法	1	—	密闭后 5 d~7 d 施药	杀小菜: 0.05 (熏蓊); 壳蓝液: 0.1 (熏蓊)
69	杀小菜 + 蓊小胙	acetochlor+ oxadiazon	37.5% 茄 可 (杀小菜 24.5% + 蓊小胙 12.5%)	湿 性	一马甜蚜小	120 mL~150 mL	虫 乙	1	—	粉氯柑后基 介或氯蓊砒 蓊介施药	蓊小胙: 0.1
70	苹甘果小 壳 + 红夜 蚧	acifluorfen+ quizalofop-ethyl	7.5% 茄 可 (苹甘果小壳 2.5% + 红夜蚧 5.0%)	蛛 甜	一马甜蚜小	100 mL~120 mL	虫 乙	1	—	2~5 酮期 施用	红夜蚧: 0.1

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 水胺硫磷 (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
71	磷乳油棉花+红蜘蛛铃	acifluorfen+quizalofop-P-ethyl	5% 虫喷(磷乳油棉花 3.5%+红蜘蛛铃 1.5%)	雾籽稻	一蓟马螟棉	120 mL~160 mL	糙米	1	、	籽稻 1~3 甲基异柳施用	磷乳油棉花—0.1; 红蜘蛛铃—0.1
				颖籽稻	一蓟马螟棉	120 mL~180 mL	糙米	1	、	籽稻 1~3 甲基异柳施用	磷乳油棉花—0.1; 红蜘蛛铃—0.1
			7.5% 虫喷(磷乳油棉花 2.5%+红蜘蛛铃 5%)	粒马	一蓟马螟棉	80 mL~100 mL	糙米	1	、	2~5 异期施用	红蜘蛛铃—0.1
72	甘棉蔗+龟沟穴棉蔗+小麦吸浆	alachlor+mcfenacet+pyrazosulfuron-ethyl	31% 撒拌毒含(甘棉蔗 7%+龟沟穴棉蔗 20%+小麦吸浆 4%)	土丙	螟棉	威方烟黄-30 g~40 g; 瓜方烟黄-50 g~70 g	棚施	1	、	丙白粉虱, 薰土施药	甘棉蔗—0.05 (蒸高); 龟沟穴棉蔗—0.05 (蒸高); 小麦吸浆—0.1 (蒸高)
73	穴麦吸浆+甘氯氟吸浆氰菊	amidosulfuron+benzoate sodium salt	6.25% 土分酯毒含(穴麦吸浆 5%+甘氯氟吸浆 1.25%)	可湿	一蓟马性异螟棉	10 g~20 g	糙米	1	、	蓝异菜青	穴麦吸浆—0.01; 甘氯氟吸浆 氰菊—0.02

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 四聚乙/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
74	醛颗粒 + 2 烟 4 草	atrazine + MCPA	45% 蛭 蛄 含 (醛颗粒 25% + 2 烟 4 草 20%)	蜗牛	一撒威百亩水黄	200 mL~250 mL	瓜根	1	、	蜗牛 4~6 亩期施药	醛颗粒 0.05—2 烟 4 草: 0.05
75	醛颗粒 + 结线黄虫	atrazine + propisochlor	40% 蛭 蛄 沟 含 (醛颗粒 20% + 结线黄虫 20%)	蜗牛	一撒威水黄	土: 200 mL~250 mL—壤: 350 mL~400 mL	瓜根	1	、	处后理甲氧酰肼悬	醛颗粒 0.05—结线黄虫 0.1
76	黄浮甘 + 蓝黄甜	benazolin-ethyl + clethodim	12% 沟菜 (黄浮甘 9.5% + 蓝黄甜 2.5%)	菜夜	一撒威水黄	200 mL~250 mL	瓜根	1	、	菜夜蛾喷后 6~8 亩期	黄浮甘 0.2 (菜夜雾)—蓝黄甜 0.5 (菜夜雾)
77	生长苹果 + 小黄虫	bensulfuron-methyl + butachlor	35% 卷叶液稻含 (生长苹果 1.6% + 小黄虫 33.4%)	二化	一撒威水黄	120 g~150 g	螟氧法	1	、	烯啶甲 2 d~3 d 或胺烯啶后 4 d~6 d 可施	生长苹果: 0.05 (溶牛)—小黄虫: 0.5 (柑牛)
78	生长苹果 + 橘黄甜	bensulfuron-methyl + carfentrazone-ethyl	38% 卷叶液稻含 (生长苹果 30% + 橘黄甜 8%)	二化	百亩水黄及蚜黄乐水黄	10 g~13.8 g	瓜根	1	、	蛾喷 15 d 后施用	生长苹果: 0.05 (溶牛)—橘黄甜: 0.1 (溶牛)
79	生长苹果 + 乳油棉黄虫	bensulfuron-methyl + mefenacet	53% 二分花籽含 (生长苹果 3% + 乳油棉黄虫 50%)	二化	一撒威水黄	麦拌: 70 g~80 g—磷苗: 50 g~60 g	螟氧法	1	、	粉二化地啶后 5 d~7 d, 螟氧法可施	生长苹果: 0.05 (溶牛)—乳油棉黄虫 0.05 (溶牛)

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 甲基噁 (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量								
80	啶磷乳油 + 仓乳油	bensulfuron-methyl + metsulfuron-methyl	10% 储稻谷赤含 (啶磷乳油 8.25% + 仓乳油 1.75%)	拟盗	蠹玉米喷及一雾快螨喷特	水方、4 g~7 g	苹果	1	—	二斑后 7 d~10 d 苹施, 叶适用液水方盗柑	啶磷乳油、0.05 (橘红); 仓乳油、0.05 (橘红)
81	啶磷乳油 + 蜘蛛	bensulfuron-methyl + molinate	45% 丙溴含 (啶磷乳油 0.5% + 蜘蛛 44.5%)	拟盗	纵喷特一雾快及卷分多雾快米喷	150 g~200 g	螟糙法棉施	1	—	花间铃拟虫施药	啶磷乳油、0.05 (橘红); 蜘蛛 0.1 (橘红)
82	啶磷乳油 + 籽喷吡	bensulfuron-methyl + pretilachlor	40% 储稻谷赤含 (啶磷乳油 4% + 籽喷吡 36%)	拟盗	一雾快米喷	60 g~80 g	苹果或螟糙	1	—		啶磷乳油、0.05 (橘红); 籽喷吡、0.1 (蚜红)
83	酮喷可 + 2 仓 4 湿	bentazone + MCPA	46% 储性谷粉含 (酮喷可 40% + 2 仓 4 湿 6%)	拟盗	螨喷散及蠹玉米喷	133 mL~167 mL	苹果	1	—	拟盗分粒期施用	酮喷可、0.1 (盗飞); 2 仓 4 湿、0.05 (橘红)
84	酮喷可 + 虱小蜘蛛 + 灰乳吡 喷除	bentazone + quizalofop-P-ethyl + fomesafen	21% 菊素含 (酮喷可 14.5% + 虱小蜘蛛 1.5% + 灰乳吡 喷除 5%)	蚜白	一雾快米喷	菜、200 mL~220 mL; 吡、186 mL~200 mL	苹果	1	—	蚜白灵后 2~3 复玉期施药	酮喷可、0.05; 虱小蜘蛛、0.1; 灰乳吡 喷除、0.1

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
85	甲基碘磺隆钠盐 + 甲基磺隆	benzoate sodium salt + mesosulfuron-methyl	3.6% 水分散粒剂 (甲基碘磺隆 0.6% + 甲基磺隆 3%)	冬小麦	一年生杂草	15 mL~25 mL	喷雾	1	—		甲基磺隆: 0.02; 甲基磺隆: 0.02
86	唑啶草酯 + 苯磺隆	carfentrazone-ethyl + tribenuron-methyl	36% 可湿性粉剂 (唑啶草酯 22% + 苯磺隆 14%)	小麦	阔叶杂草	4 g~5 g	喷雾	1	—	小麦返青后拔节前茎叶喷雾	苯磺隆: 0.05
87	氰氟草酯 + 精噁唑禾草灵	cyhalofop-butyl + fenoxaprop-P-ethyl	10% 乳油 (氰氟草酯 5% + 精噁唑禾草灵 5%)	水稻	禾本科杂草	40 mL~60 mL	喷雾	1	—	水稻 5 叶后期施用	精噁唑禾草灵: 0.1 (糙米); 氰氟草酯: 0.1 (糙米)
88	氰氟草酯 + 五氟磺草胺	cyhalofop-butyl + penoxsulam	6% 油悬剂 (氰氟草酯 5% + 五氟磺草胺 1%)	水稻	禾本科杂草	100 mL~133 mL	喷雾	1	—	茎叶处理	氰氟草酯: 0.1 (糙米)
89	胺鲜酯 + 乙烯利	diethyl aminoethyl hexanoate + ethephon	30% 水剂 (胺鲜酯 3% + 乙烯利 27%)	玉米	调节生长	20 mL~25 mL	喷雾	1	—	—	乙烯利: 0.5

表 3 (续)

序号	农药			适用作物	防治对象	每 667 m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最高残留限量 (MRL) 参考值/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	含量及剂型								
90	敌草快 + 百草枯	diquat + paraquat	20% 水剂 (敌草快 8% + 百草枯 12%)	甘蔗	杂草	150 mL~200 mL	喷雾	1	—	杂草生长旺盛期定向喷雾, 避免喷雾至甘蔗上	敌草快: 0.05
91	敌草隆 + 噻苯隆	diuron + thidiazuron	54% 悬浮剂 (敌草隆 18% + 噻苯隆 36%)	棉花	调节生长	9 mL~12 mL	喷雾	1	7	于棉花进入停滞发育期施药	噻苯隆: 1 (棉籽)
92	精噁唑禾草灵 + 噻酚磺隆 + 苯磺隆	fenoxaprop-P-ethyl + thifensulfuron-methyl + tribenuron-methyl	55% 可湿性粉剂 (精噁唑禾草灵 45% + 噻酚磺隆 2% + 苯磺隆 8%)	小麦	一年生禾本科及阔叶杂草	10 g~12 g	喷雾	1	—		精噁唑禾草灵: 0.1; 噻酚磺隆: 0.05; 苯磺隆: 0.05
93	双氟磺草胺 + 唑啶磺草胺	florasulam + flumetsulam	17.5% 悬浮剂 (双氟磺草胺 7.5% + 唑啶磺草胺 10%)	小麦	阔叶杂草	3 mL~4.5 mL	喷雾	1	—	苗期施药	双氟磺草胺: 0.01
94	氯氟吡氧乙酸 + 2 甲 4 氯钠盐	fluroxypyr + MCPA-Na	30% 可湿性粉剂 (氯氟吡氧乙酸 5% + 2 甲 4 氯钠盐 25%)	水稻	一年生阔叶杂草及莎草	100 g~150 g	喷雾	1	—	水稻分蘖末期茎叶喷雾	氯氟吡氧乙酸: 0.2 (稻谷); 2 甲 4 氯: 0.05 (糙米)

表 3 (续)

序号	农药		防治对象	适用作物	每 667 m ² 每次制含施用型或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	最后一次施药距收获的天数 (安全间隔期)/d	实施要点说明	最大残留限量 (MRL) 阿维菌/ (mg/kg)
	通用名	英文通用名	剂型及含量							
95	素联苯菊酯乳+油甘蓝	fluroxypyr+tribenuron-methyl	20% 小菜蛾喷含 (油甘蓝 2.7%+素联苯菊酯乳 17.3%)	雾丁	醚脲苹果 30 g~40 g	红蜘蛛	1	:	蛛雾丁液 期施药	素联苯菊酯乳;0.2;油甘蓝;0.05
96	甲氧蓝+油甘蓝	isoproturon+pretilachlor	60% 小菜蛾喷含 (甲氧蓝 59%+油甘蓝 1%)	雾丁	一可湿苹果 90 g~120 g	红蜘蛛	1	:		甲氧蓝; 0.05;油甘蓝;0.05
97	性酯乳粉+吡虫啉粉	sodium l-naphthal acitic acid+sodium nitrophenolate	2.85% 微含 (2,4-烟虫草油 0.15%+对虫草油 0.9%+蚜油 0.6%+性酯乳粉 1.2%)	杀单	豆美湿洲 4 000~6 000 倍斑 (4.8 mg/L ~7.1 mg/L)	红蜘蛛	2	14		
98	油甘蓝+潜蝇甘蓝	thiameturon-methyl+thifensulfuron-methyl	10% 小菜蛾喷含 (油甘蓝 7%+潜蝇甘蓝 3%)	蛛雾丁	一可湿醚脲苹果 10g~15 g	红蜘蛛	1	:		油甘蓝; 0.05;潜蝇甘蓝;0.05

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

农药合理使用准则(十)

GB/T 8321.10—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn

服务热线:400-168-0010

2018年2月第一版

*

书号:155066·1-59636

版权专有 侵权必究



GB/T 8321.10-2018